

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

(PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2008)

NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA

ESPECIALIDADE COM ACESSO DIRETO

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Anestesiologia | Otorrinolaringologia |
| Cirurgia Geral | Pediatria |
| Clínica Médica | Psiquiatria |
| Neurologia | Radiologia e Diagnóstico por Imagem |
| Obstetrícia e Ginecologia | Neurocirurgia |
| Ortopedia e Traumatologia | |

- 1) O diagnóstico do tétano é feito por
 - (A) anamnese e exame físico.
 - (B) hemocultura.
 - (C) cultura de material coletado na ferida.
 - (D) sorologia específica.
 - (E) necropsia.
- 2) À direção nacional Sistema Único de Saúde (SUS) compete:
 - (A) participar das ações de controle e avaliação das condições e dos ambientes de trabalho.
 - (B) prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar, supletivamente, ações e serviços de saúde.
 - (C) formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
 - (D) identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade, de referência estadual e regional.
 - (E) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.
- 3) Em relação as alterações hematológicas no curso de uma gravidez normal assinale a opção correta.
 - (A) O volume plasmático aumenta proporcionalmente mais do que o volume das hemácias.
 - (B) O volume das hemácias aumenta proporcionalmente mais do que o volume plasmático.
 - (C) O volume plasmático aumenta e o volume de hemácias permanece constante.
 - (D) O volume das hemácias diminui e o volume plasmático permanece constante.
 - (E) Não há alteração do volume plasmático e de hemácias.
- 4) Qual das opções abaixo corresponde às patologias relacionadas ao comprometimento do aparelho cardiovascular no Lupus Eritematoso Sistêmico e no Lupus Neonatal, respectivamente?
 - (A) Endocardite e pericardite.
 - (B) Pericardite e bloqueio átrio-ventricular total.
 - (C) Miocardite e bloqueio átrio-ventricular total.
 - (D) Pericardite e taquicardia supraventricular.
 - (E) Endocardite e bradicardia sinusal.

- 5) Em relação às medidas preventivas aos acidentes ocupacionais com material pérfuro-cortante e fluidos orgânicos é correto afirmar que
- (A) o material pérfuro-cortante estéril pode ser desprezado em lixo comum.
 - (B) se pode desprezar as agulhas em recipientes de paredes rígidas sem desconectá-las das seringas.
 - (C) é preferível o uso de óculos protetor durante cirurgias com grande volume de sangue, em substituição ao protetor facial.
 - (D) não há risco ao recapear agulhas usadas com a utilização de pinças.
 - (E) a imobilização do paciente durante a realização de algum procedimento com material perfuro-cortante não é relevante.
- 6) Segundo Framingham qual dos critérios abaixo é considerado menor para diagnóstico de insuficiência cardíaca?
- (A) Derrame pleural.
 - (B) Refluxo hepatojugular.
 - (C) Ritmo em B3.
 - (D) Cardiomegalia.
 - (E) Alteração de pressão arterial.
- 7) Nível baixo de alfa-feto-proteína no soro materno está associado à
- (A) aneuploidia.
 - (B) defeito de fechamento de tubo neural fetal.
 - (C) anencefalia.
 - (D) onfalocele.
 - (E) meningomielocele.

- 8) Ao realizar a primeira manobra de Leopold-Zweifel, foi observado um pólo fetal volumoso, de superfície irregular, resistente, mas redutível. A segunda manobra revelou as pequenas partes fetais orientadas para o lado direito materno. Na terceira manobra foi apreendido um pólo menor que o anterior, liso e consistente. Com estes achados, conclui-se que a situação, apresentação e posição fetais são respectivamente:
- (A) frontal, face e inferior.
(B) oblíqua, pélvica e direita.
(C) longitudinal, cefálica e esquerda.
(D) transversa, córmica e superior.
(E) sagital, vértice e posterior.
- 9) Durante a fase lútea do ciclo menstrual, o aspecto histológico do endométrio é caracterizado como
- (A) atrófico.
(B) secretor.
(C) proliferativo.
(D) hiperplásico.
(E) hipotrófico.
- 10) Em relação à direção do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a opção INCORRETA.
- (A) É única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal.
(B) No âmbito da União é exercida pelo Ministério da Saúde.
(C) No âmbito dos Estados é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
(D) No Distrito Federal é exercida diretamente pelo Ministério da Saúde.
(E) No âmbito dos municípios é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- 11) Em relação a Esclerodermia, assinale a opção correta.
- (A) É encontrada em crianças e em adolescentes.
(B) É mais freqüente e grave em jovens negros.
(C) Possui maior incidência na segunda e terceira décadas.
(D) Afeta cinco vezes mais os homens.
(E) Não acomete os europeus.

- 12) Qual agente etiológico da parotidite pós-operatória?
- (A) Estreptococos.
(B) E. coli.
(C) Estafilococos.
(D) Klebsiella.
(E) Micoplasma.
- 13) É uma contra-indicação absoluta para cirurgia da obesidade:
- (A) idade (adolescentes/idosos).
(B) síndrome de Prader-Willi.
(C) peso acima de 200 Kg.
(D) IMC > 40kg/m².
(E) pacientes com alto risco para TVP.
- 14) Um distúrbio de ritmo, comum na intoxicação digitálica é a
(o)
- (A) onda P.
(B) ritmo sinusal.
(C) taquicardia atrial.
(D) fibrilação atrial.
(E) extrassístole ventricular.
- 15) Qual marcador se encontra alterado na Cirrose Biliar primária?
- (A) HBsAg.
(B) Alfa-feto-proteína.
(C) Anticorpo Antimitocôndria.
(D) Anticorpo Antirribossoma.
(E) IgG.
- 16) São características da insuficiência renal aguda pré-renal:
- (A) osmolaridade urinária variável, creatinina < 20mg/dl.
(B) osmolaridade urinária > 500 mOs/L, creatinina < 20mg/dl.
(C) creatinina > 40mg/dl e osmolaridade urinária = plasma.
(D) osmolaridade urinária > 500 mOs/L, creatinina > 40mg/dl.
(E) creatinina e osmolaridade urinária variáveis.
- 17) A conduta no carcinoma *in situ* do colo uterino é
- (A) retirada da lesão sob visualização da colposcopia.
(B) histerectomia com anexectomia bilateral.
(C) histerectomia simples.
(D) conização.
(E) expectante.

- 18) Qual a causa mais comum de púrpura não trombocitopênica na infância?
- (A) Infecciosa.
(B) Por hipersensibilidade medicamentosa.
(C) Por desordens da função plaquetária.
(D) Púrpura de Henoch-Schönlein.
(E) Síndrome hemolítico-urêmica.
- 19) Qual dos grupos de antibióticos abaixo é considerado de primeira escolha para o tratamento da infecção pela *Bordetella pertussis*?
- (A) Penicilinas.
(B) Aminoglicosídeos.
(C) Macrolídeos.
(D) Carbapenêmicos.
(E) Cefalosporinas.
- 20) Em relação ao mieloma múltiplo é correto afirmar que
- (A) é responsável por 80% das neoplasias malignas hematológicas.
(B) cursa apenas com hipotermia.
(C) ocorre com frequencia em mulatos, pardos e albinos.
(D) a dor óssea é a queixa mais frequente, em geral, induzida pelo movimento, não ocorrendo a noite, exceto com a mudança de posição.
(E) é a proliferação neoplásica de um clone de plasmócitos, envolvidos na produção de uma imunoglobulina ainda não identificada.
- 21) Quanto à vacinação contra Influenza (gripe) é INCORRETO afirmar que
- (A) pode ser aplicada a partir dos seis meses de idade.
(B) pode ser aplicada simultaneamente com qualquer das outras vacinas do Programa Nacional de Imunização.
(C) existem três tipos de vacinas contra o vírus Influenza.
(D) sua composição é recomendada anualmente pela Organização Mundial de Saúde (OMS), com base nas informações recebidas de todo o mundo sobre a prevalência de cepas circulantes.
(E) sua via de administração é, exclusivamente, intramuscular.

- 22) São causas comuns de obstrução do intestino delgado:
- (A) Hérnias de hiato.
 - (B) As aderências e as hérnias externas.
 - (C) Prolapsos de reto.
 - (D) Válvulas retais.
 - (E) Abscessos retais.
- 23) A reposição de potássio deve ser evitada no pós-operatório imediato porque
- (A) a lesão tissular aumenta a concentração de potássio na circulação e há aumento da atividade da aldosterona.
 - (B) a reposição de potássio é realizada no per-operatório.
 - (C) a reposição de potássio deve ser realizada sempre, independentemente de se tratar de pós operatório.
 - (D) existe uma diminuição da atividade da aldosterona.
 - (E) a reposição de potássio deve ser realizada sempre, pois no pós operatório, existe tendência a hipocalemia.
- 24) A porcentagem do número de óbitos de pessoas de 50 anos ou mais em relação ao número total de óbitos é conhecida como
- (A) prevalência proporcional.
 - (B) índice de Swaroop e Uemura.
 - (C) índice de letalidade.
 - (D) índice de morbidade.
 - (E) índice de esperança de vida.
- 25) Qual das manifestações clínicas do lupus eritematoso sistêmico, abaixo citadas, é considerada a menos frequente?
- (A) trombocitopenia.
 - (B) pericardite.
 - (C) Anemia.
 - (D) Artralgia.
 - (E) Proteinúria.
- 26) Qual o agente etiológico responsável pela epiglote aguda na infância?
- (A) Streptococcus pneumoniae.
 - (B) Staphylococcus aureus.
 - (C) Streptococcus pyogenes.
 - (D) Mycoplasma pneumoniae.
 - (E) Haemophilus influenzae.

- 27) Em relação as fistulas anorrectais supra esfínterianas, assinale a opção correta.
- (A) São as mais comuns.
(B) O trajeto fistuloso é confinado ao plano interesfíncteriano.
(C) A fistula conecta o plano interesfíncteriano com a fossa isquirretal, perfurando o esfíncter externo.
(D) O trajeto fistuloso forma uma alça sobre o esfíncter externo e perfura o elevador do ânus.
(E) O trajeto passa do reto para a pele perianal.
- 28) Assinale a condição que contra-indica a vacinação.
- (A) Vacina de vírus vivos atenuados em pessoas com imunodeficiência congênita.
(B) Doença neurológica estável.
(C) Desnutrição.
(D) Prematuridade ou baixo peso ao nascer.
(E) Paciente com escabiose.
- 29) A vacinação na gestante pode acarretar efeitos nocivos ao conceito. Além da vacina antitetânica, de uso indicado no pré-natal, as vacinas que podem ser utilizadas durante o período gravídico são:
- (A) hepatite B e sarampo.
(B) sarampo e caxumba.
(C) rubéola e caxumba.
(D) hepatite B e influenza.
(E) rubéola e influenza.
- 30) Assinale a opção que descreve a "Síndrome da embolia gordurosa".
- (A) Insuficiência cardíaca e respiratória, com antecedente de fratura de ossos longos.
(B) Disfunção neurológica, insuficiência respiratória e petéquias nas axilas, no tórax e parte proximal dos braços.
(C) Arritmia cardíaca e petéquias no tórax.
(D) Fraturas de ossos longos e insuficiência respiratória.
(E) Arritmia cardíaca, insuficiência respiratória e fraturas de ossos longos.

- 31) Qual das alterações endócrino-metabólicas abaixo, pode ser considerada como efeito adverso associado ao uso crônico dos corticosteróides?
- (A) Hipercalemia.
(B) Hipoglicemia.
(C) Hiperlipidemia.
(D) Perda de peso.
(E) Puberdade precoce.
- 32) Em relação ao Calendário Básico de Vacinação de Rotina é correto afirmar que
- (A) ao nascer administra-se vacina para Hepatite B, BCG e DTP.
(B) aos dois meses administra-se DTP e Anti-Pólio.
(C) aos nove meses administra-se a vacina contra sarampo e febre amarela.
(D) a vacina contra Hepatite B deve ser aplicada nas primeiras 24 horas de vida, ou após a alta da maternidade.
(E) não existe intervalo mínimo entre as doses da vacina oral contra poliomielite.
- 33) É uma contra-indicação de tomografia computadorizada de abdome quando há
- (A) trauma fechado.
(B) suspeita de lesão pancreática ou duodenal.
(C) choque refratário.
(D) exame físico não confiável.
(E) suspeita de lesão de víscera oca.
- 34) Dentre os fármacos abaixo citados, qual o que pode causar neutropenia relacionada ao seu uso no paciente pediátrico?
- (A) Ceftriaxone.
(B) Ambroxol.
(C) Fenoterol.
(D) Paracetamol.
(E) Sulfametoxazol.

- 35) A capacidade de certos organismos de penetrar e se desenvolver no novo hospedeiro ocasionando infecção é a definição de
- (A) virulência.
(B) patogenicidade.
(C) dose infectante.
(D) poder invasivo.
(E) infectividade.
- 36) A articulação das políticas e programas do Sistema Único da Saúde (SUS), a cargo das comissões intersetoriais abrange diversas atividades, EXCETO
- (A) alimentação e nutrição.
(B) saneamento e meio-ambiente.
(C) vigilância sanitária.
(D) ciência e tecnologia.
(E) educação.
- 37) São consideradas manifestações clínicas de hipoglicemias na criança, EXCETO
- (A) palpitação.
(B) diplopia.
(C) convulsões.
(D) poliúria.
(E) cefaléia.
- 38) Em relação a artrite reumatóide assinale a opção INCORRETA.
- (A) As mulheres são afetadas 3 vezes mais que os homens.
(B) Inicia-se mais freqüentemente na quinta e sexta década de vida.
(C) Os estudos indicam predisposição genética.
(D) Lesões microvalvulares e um aumento do número de células de revestimentos sinovial são as lesões encontradas na sinovite reumatóide.
(E) As articulações interfalangianas distais são as mais acometidas.

- 39) Durante a primeira semana de vida os recém-nascidos apresentam uma perda ponderal em relação ao peso de nascimento. Tal fato se deve em parte a excreção do excesso de líquido extravascular e possivelmente por baixa ingestão nos primeiros dias de vida. Qual o percentual de perda de peso estimado nesse período?
- (A) 10 %
(B) 15 %
(C) 20 %
(D) 25 %
(E) 30 %
- 40) A respeito da arginina assinale a opção correta.
- (A) Diminui a produção de Interleucina 2.
(B) Diminui a proliferação de células T.
(C) Diminui o crescimento de tumores, facilitando a ação de agentes quimioterápicos.
(D) Não é precursor do Óxido Nítrico.
(E) Estimula crescimento tumoral, facilitando a ação de agentes quimioterápicos e da radioterapicos.
- 41) Na síndrome de Mallory-Weiss ocorre hemorragia causada por qual tipo de lesão esofagiana?
- (A) Divertículos.
(B) Úlceras.
(C) Varizes.
(D) Lacerações da mucosa.
(E) Ectasias vasculares.
- 42) Um paciente apresenta fratura supracondilar do úmero. Neste caso a lesão associada que estará presente com maior frequência é a do (a)
- (A) nervo axilar.
(B) artéria radial.
(C) artéria subclávia.
(D) artéria axilar.
(E) nervo mediano.

- 43) A desaceleração tardia dos batimentos cardiotípicos nos dá o diagnóstico de
- (A) hipertonia uterina.
 - (B) hipotonia uterina.
 - (C) hipóxia fetal.
 - (D) descolamento prematuro da placenta.
 - (E) morte fetal.
- 44) O ciclo menstrual pode apresentar vários tipos de alteração. Quando ocorre um fluxo menstrual excessivo, com sangramento prolongado, período irregular e intervalos freqüentes, estamos diante de um quadro de
- (A) metrorragia.
 - (B) polimenorréia.
 - (C) hipomenorréia.
 - (D) oligomenorréia.
 - (E) menometrorragia.
- 45) A quimioprofilaxia, na exposição ocupacional, ao HIV é recomendada quando há
- (A) exposição percutânea com material de médio risco de soroconversão.
 - (B) contato de sangue com mucosa.
 - (C) exposição percutânea a fluidos contendo sangue visível.
 - (D) exposição de mucosa a fluidos orgânicos.
 - (E) exposição percutânea com volume pequeno de sangue e carga viral reduzida.
- 46) Na presença de uma adenite inguinal crônica que evolui para úlceras, fistulas e estenose retal, a doença a ser pesquisada é a (o)
- (A) donovanose.
 - (B) sífilis.
 - (C) Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.
 - (D) cancro mole.
 - (E) linfogranuloma venéreo.

- 47) Qual a complicação aguda mais encontrada na criança com glomerulonefrite aguda pós-estreptocócica?
- (A) Hipertensão arterial sistêmica.
(B) Hipercalemia.
(C) Uremia.
(D) Convulsões.
(E) Hiperfosfatemia.
- 48) Qual o tumor primário mais comum do Sistema Nervoso Central?
- (A) Estrocitoma.
(B) Meningioma.
(C) Glioma.
(D) Chantoma.
(E) Linfoma.
- 49) O(s) fator(es) materno(s) que está(ão) frequentemente relacionado(s) ao descolamento prematuro da placenta normoinserida é(são)
- (A) hipertireoidismo.
(B) hipertensão arterial.
(C) idade entre 20 e 30 anos.
(D) curetagens uterinas múltiplas.
(E) neoplasia trofoblástica gestacional.
- 50) Qual das cardiopatias congênitas abaixo relacionadas cursam com hiperfluxo pulmonar e sintomatologia de insuficiência cardíaca congestiva como principal manifestação clínica da doença?
- (A) Atresia tricúspide.
(B) Comunicação interventricular.
(C) Atresia pulmonar.
(D) Transposição das grandes artérias.
(E) Tetralogia de Fallot.