

**MARINHA DO BRASIL**  
**DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA**

*(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM 2012)*

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL EXTRA**

**ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO**

<b>Cirurgia Geral</b>	<b>Psiquiatria</b>
<b>Medicina Nuclear</b>	<b>Radiologia e Diagnóstico por Imagem</b>
<b>Obstetrícia e Ginecologia</b>	<b>Neurocirurgia</b>
<b>Ortopedia e Traumatologia</b>	<b>Clínica Médica</b>
<b>Otorrinolaringologia</b>	<b>Patologia</b>
<b>Pediatria</b>	<b>Neurologia</b>

- 1) O partograma é a representação gráfica do trabalho de parto permitindo acompanhar sua evolução, documentar e diagnosticar alterações e indicar a tomada de condutas pelo obstetra. Todos os parâmetros abaixo devem constar no partograma, EXCETO:
- (A) contrações uterinas.
  - (B) frequência cardíaca fetal.
  - (C) grau de maturidade placentária.
  - (D) dilatação cervical.
  - (E) condição da bolsa e do líquido amniótico.
- 2) Paciente 42 anos obeso e tabagista, deu entrada na UPA de Copacabana às 5h da manhã queixando-se de dor precordial típica iniciada há aproximadamente 40 minutos. Ao exame físico apresentava sudorese fria, FC 109 bpm, FR 24 irpm, PA: 159 x 100 mmhg, B4, sem sopros. Realizado de imediato um eletrocardiograma que mostrou supradesnivelamento de ST em V2 a V4. A conduta médica foi a trombólise. Qual situação abaixo seria contra indicação relativa para a trombólise realizada?
- (A) Suspeita de dissecção aórtica.
  - (B) Retinopatia diabética hemorrágica.
  - (C) AVC hemorrágico.
  - (D) Sangramento interno ativo.
  - (E) Hipertensão Grave.
- 3) Qual das opções abaixo é a correta em relação a menopausa?
- (A) O evento central da menopausa é a insuficiência hipotálâmica, com diminuição dos hormônios FSH e LH, levando a insuficiência ovariana secundária.
  - (B) Dentre os principais problemas de saúde em mulheres na menopausa estão os sintomas vasomotores, atrofia urogenital e osteoporose.
  - (C) A principal droga na terapia hormonal da menopausa é O FSH recombinante
  - (D) A avaliação complementar da osteoporose inclui a dosagem de cálcio sérico e a cintilografia óssea.
  - (E) A terapia hormonal protege a mulher na menopausa de câncer de mama, infarto e acidente vascular cerebral.

- 4) Os prolapso ou distopias genitais são distúrbios da sustentação pélvica. As formas mais observadas são o prolapso uterino, a cistocele e a retocele. Qual opção abaixo NÃO está compreendida no rol de possíveis tratamentos destas patologias?
- (A) Pessários vaginais.
  - (B) Colporrafia vaginal anterior e posterior.
  - (C) Suspensão do ligamento uterossacro.
  - (D) Cirurgia de Wertheim-Meigs.
  - (E) Colpocleise.
- 5) A Síndrome Nefrótica é um diagnóstico frequente na rotina da clínica médica. É caracterizada por proteinúria, hipoalbuminemia e hipercolesterolemia. As enfermidades abaixo são causa de Síndrome Nefrótica, EXCETO:
- (A) Nefropatia Diabética.
  - (B) Glomerulonefrite Membranosa.
  - (C) Nefropatia por IgA.
  - (D) Doença por deposição de cadeia leve.
  - (E) Glomeruloesclerose segmentar e focal.
- 6) O clitóris, e seu correspondente no sexo masculino, a glândula peniana, possuem a mesma origem embriológica. Qual das opções corresponde a referida estrutura embrionária?
- (A) Ductos paramesonéfricos.
  - (B) Seio urogenital.
  - (C) Tubérculo genital.
  - (D) Gubernáculo.
  - (E) Pregas urogenitais.
- 7) A doença de Kawasaki é uma vasculite febril aguda da infância que apresenta as seguintes características:
- (A) leucopenia com predominância de linfócitos.
  - (B) descamação, formação de aneurismas e persistência da febre na fase subaguda.
  - (C) regressão dos sinais clínicos da doença e permanência do VHS alto na fase de convalescência.
  - (D) febre com duração menor que 5 dias, associado a artrite, língua em framboesa e doença coronariana.
  - (E) Febre com duração de pelo menos 5 dias, língua em framboesa, descamação periungueal, artrite e doença coronariana.

- 8) Marque a opção correta em relação a AIDS na gravidez.
- (A) O recém-nato pode receber o AZT por solução oral nas primeiras 8 horas após o nascimento mantendo-se até 6 semanas.
  - (B) O aleitamento materno não oferece risco de transmissão.
  - (C) Se nenhuma medida preventiva for tomada, o risco de transmissão vertical é de 95%.
  - (D) O teste anti-HIV só deve ser solicitado no 1º trimestre de gestação se a paciente pertencer a determinados grupos de risco.
  - (E) O parto vaginal é terminantemente proibido nos casos de AIDS na gestação.
- 9) Um trauma Duodenal com laceração e ruptura menor que 50% da circunferência, em paciente estável, deve ser tratado por meio de:
- (A) sutura simples em 1 ou 2 planos.
  - (B) duodenostomia lateral com tubo.
  - (C) cirurgia de Whipple - gastroduodenopancreatectomia.
  - (D) cirurgia de Vaughan - exclusão duodenal.
  - (E) "Damage Control"- controle de hemorragia e contaminação.
- 10) A adolescência é a fase da vida que se situa entre 10 a 19 anos de idade. Em comparação a outras faixas etárias, a taxa de mortalidade geral na adolescência no Brasil é baixa. Qual é a primeira causa de morte em adolescentes no Brasil?
- (A) Doença Neoplásica.
  - (B) Doenças Infecto Contagiosas.
  - (C) Desnutrição proteico calórica.
  - (D) Causas externas.
  - (E) Doenças Respiratórias.
- 11) Qual a indicação de tratamento em paciente com volvo de sigmóide em paciente obstruído, com sinais de toxemia e pneumatose em sigmóide?
- (A) Descompressão por colonoscopia flexível.
  - (B) Videolaparoscopia para manipulação do volvo.
  - (C) Retossigmoidoscopia rígida.
  - (D) Cirurgia de Hartmann.
  - (E) Conduta Expectante.

12) Considerando os aspectos médico-legais em obstetrícia, assinale V para verdadeiro e F para falso nas opções abaixo, selecionando a seguir a opção que apresenta a sequência correta.

- ( ) O aborto é permitido segundo o Código Penal quando a gravidez resultar de estupro e houver consentimento da gestante.
- ( ) Segundo a Lei do Planejamento Familiar, é permitida a esterelização voluntária em casais acima de 25 anos, com capacidade civil plena e, pelo menos, 2 filhos vivos.
- ( ) A Organização Mundial de Saúde permite a clonagem de embriões humanos somente para fins de pesquisa.
- ( ) O Conselho de Ética Médica não permite qualquer tipo de comercialização de tecidos humanos e condena a remuneração na doação de óocitos e sêmen.

- (A) (V) (V) (V) (V)
- (B) (V) (F) (F) (F)
- (C) (F) (V) (V) (F)
- (D) (F) (V) (F) (V)
- (E) (V) (V) (F) (V)

13) Gota é uma doença metabólica que apresenta, como manifestação clínica, artrite aguda. O tratamento se diferencia na fase aguda e na fase crônica, com terapia hipouricêmica. Para o controle definitivo da gota com terapia hipouricêmica o melhor fármaco a ser usado é:

- (A) prednisona.
- (B) diclofenaco sódico.
- (C) probenecida.
- (D) ibuprofeno.
- (E) alopurinol.

14) Criança de 5 anos, atendida pelo pediatra com quadro de tosse produtiva com duração maior que 10 dias, apresentando piora ao dormir. Ao exame: secreção amarelada em vias aéreas superiores e febre de 39°C. Marque a opção que corresponde ao diagnóstico desta criança.

- (A) Pneumonia.
- (B) Amigdalite.
- (C) Sinusite.
- (D) Asma brônquica.
- (E) Laringite.

Prova : Amarela

Concurso : PRM/2012

Profissão : ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

- 15) O perfil biofísico fetal é um teste de avaliação da vitalidade fetal. Os parâmetros abaixo fazem parte desta avaliação, EXCETO:
- (A) índice de resistência da artéria umbilical.
  - (B) movimentos respiratórios fetais.
  - (C) movimentação fetal.
  - (D) tono fetal.
  - (E) volume do líquido amniótico.
- 16) Na laparotomia exploradora, a primeira medida visa interromper a hemorragia, conseguir a hemostasia temporária para repor volume e reestabelecer o equilíbrio circulatório. As afirmativas abaixo são recursos para hemostasia temporária, EXCETO:
- (A) Manobra de Pringle.
  - (B) Shunt intracava inferior retro-hepática.
  - (C) Clampeamento aórtico.
  - (D) Compressão Manual.
  - (E) Manobra de Mattox.
- 17) Assinale a técnica utilizada nas herniorrafias inguinais, que fixa-se uma tela de material sintético ao ligamento inguinal, à bainha dos retos e à aponeurose e fibras do músculo oblíquo interno, com fio inabsorvível e livre de tensão.
- (A) McVay.
  - (B) Schoudice.
  - (C) Stoppa.
  - (D) Andrews.
  - (E) Lichtenstein.

- 18) A hipertensão Pulmonar Persistente Neonatal ocorre nos Recém-Natos (RN) a termo e pós-termo. Marque a opção INCORRETA.
- (A) alguns fatores predisponentes incluem asfixia, pneumonia por aspiração de mecônio e policitemia.
  - (B) o RN manifesta piora clínica dentro das primeiras 12 horas de vida ou na própria sala de parto.
  - (C) o diagnóstico deve ser suspeito em todos os RNs que apresentam cianose com ou sem desconforto respiratório, crescimento intra-uterino retardado (CIUR), policitemia, e asfixia ao nascimento.
  - (D) a resistência vascular pulmonar encontra-se baixa em relação a pressão sistêmica fetal.
  - (E) a cardiopatia cianogênica pode ser considerada um diagnóstico diferencial.
- 19) O termo "doenças benignas da mama" abrange uma série de patologias com sinais e sintomas bem distintos. Dentre as alternativas abaixo, é correto afirmar que:
- (A) o fibroadenoma não está associado a aumento do risco de câncer de mama.
  - (B) os tumores filóides são muito frequentes e tem caráter bilateral na maioria dos casos.
  - (C) o uso excessivo de álcool é uma das causas extramamárias de secreção papilar anormal.
  - (D) o microorganismo mais comum no abscesso subareolar crônico é o Plasmodium sp.
  - (E) a mastalgia cíclica está relacionada aos sintomas pré-menstruais que começam na fase proliferativa do ciclo.
- 20) Recém-nascido de 39 semanas, nascido de parto vaginal, apresentou no primeiro minuto de vida: ausência de choro, FC:80 bpm, alguns movimentos de extremidades, careta durante a aspiração de vias aéreas e cianose de mãos e pés. O valor do APGAR no primeiro minuto é:
- (A) 2
  - (B) 3
  - (C) 4
  - (D) 6
  - (E) 9

- 21) O eletrocardiograma é um exame fundamental no diagnóstico da cardiopatia isquêmica aguda. No estágio inicial da isquemia, observa-se a seguinte alteração no eletrocardiograma:
- (A) onda T invertida.
  - (B) onda Q.
  - (C) supradesnivelamento de ST.
  - (D) amputação de onda R.
  - (E) onda T amplas, hiperagudas, apiculada.
- 22) Em relação aos sinais e sintomas de câncer esofágico, os que apresentam maior incidência são:
- (A) dor e dispneia.
  - (B) perda de peso e disfagia.
  - (C) disfagia e vômitos.
  - (D) dispneia e dor.
  - (E) vômitos e perda de peso.
- 23) A doença pulmonar obstrutiva crônica pela definição da GOLD 2007 é prevenível e tratável. Assinale, das opções abaixo, o fator de risco de maior importância relacionado a essa doença.
- (A) Genético.
  - (B) Sexo.
  - (C) Fumo.
  - (D) Idade.
  - (E) Nível socioeconômico.
- 24) Considerando a classificação do risco operatório de acordo com o estado físico estabelecido pela Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA), um paciente ASA III apresenta:
- (A) ausência de doenças associadas.
  - (B) doença sistêmica com limitação funcional.
  - (C) doença sistêmica leve sem limitação funcional.
  - (D) doença sistêmica grave com risco de vida.
  - (E) pouca probabilidade de sobreviver 24 horas com ou sem operação.



- 25) Quais sinais e sintomas uma paciente de 80 anos, feminina, apresenta na Penta de Reynold?
- (A) Febre, icterícia, dor abdominal, alteração do estado mental e hipotensão.
  - (B) Febre, choque, crise convulsiva, icterícia e Calafrios.
  - (C) Dor abdominal, hipotensão arterial, convulsões, taquicardia e calafrios.
  - (D) Icterícia, febre, hipertensão arterial, convulsões e taquicardia.
  - (E) Taquicardia, choque, hipertensão, dor abdominal e Icterícia.
- 26) Em relação às desnutrições Marasmo e Kwashiorkor assinale a opção INCORRETA:
- (A) Kwashiorkor significa doença do primogênito.
  - (B) A hipoalbuminemia é mais intensa no Marasmo.
  - (C) As lesões de pele (hipocrômicas ao lado de hipercrômicas, com descamação) são presentes no Kwashiorkor.
  - (D) O Marasmo tem a característica da fâcies senil ou Simiesa.
  - (E) No Marasmo é rara a hepatomegalia e os cabelos são finos e o comportamento é apático.
- 27) Nos casos de catástrofes abdominais, devido ao risco de "exanguinação", quando se deve realizar laparotomia imediata, qual deve ser o acesso venoso utilizado?
- (A) Dissecção de Veia Basílica.
  - (B) Dissecção de Veia Safena Magna.
  - (C) Dissecção de Veia Axilar.
  - (D) Punção de Veia Subclávia.
  - (E) Punção de Veia Jugular.
- 28) Dentre as várias técnicas cirúrgicas para tratamento da Obesidade Mórbida, existem as técnicas restritivas e as restritivas-disabsortivas. Das opções abaixo, qual delas é apenas restritiva?
- (A) Bypass gástrico com Y de Roux aberto ou por vídeo-laparoscopia.
  - (B) Derivação biliopancreática (Duodenal Switch).
  - (C) Derivação jejunoileal.
  - (D) Derivação bileopancreática (Cirurgia de Scopinaro).
  - (E) Gastroplastia vertical (Cirurgia de Mason).

- 29) A Síndrome de Bartter, doença tubular renal genética, caracteriza-se por apresentar:
- (A) perda de sódio, potássio, cloro com níveis pressóricos elevados.
  - (B) sódio, potássio baixos associado à acidose metabólica Hipocalêmica.
  - (C) poliúria, polidipsia, deficiência de ganho ponderoestatural e níveis pressóricos normais.
  - (D) alcalose metabólica hipocalêmica com níveis de renina e aldosterona normais.
  - (E) poliúria, polidipsia, acidose metabólica hipocalêmica.
- 30) Lactente de 6 meses chega ao pronto socorro em crise convulsiva tônico-clônica. O responsável relata que o bebê estava sonolento e choroso. No momento do exame encontrava-se pálido, não responsivo aos estímulos e com hemorragia retiniana. A causa mais provável é:
- (A) Sepses.
  - (B) Meningite.
  - (C) Astrocitoma.
  - (D) Retinoblastoma.
  - (E) Síndrome do Bebê Sacudido.
- 31) As características clínicas de retardo mental, alta estatura, face longa, mandíbula proeminente, comportamento e fala estereotipado no sexo masculino caracterizam a anomalia cromossômica denominada:
- (A) Síndrome do X-Frágil.
  - (B) Síndrome de Turner.
  - (C) Síndrome de Klinefelter.
  - (D) Homem 47, XYY.
  - (E) Síndrome Williams.
- 32) Miastenia Gravis é um distúrbio neuromuscular caracterizado por fraqueza e fadigabilidade dos músculos esqueléticos. O medicamento de escolha para melhora dos sintomas é:
- (A) hidrocortisona.
  - (B) rivastigmina.
  - (C) prolopa.
  - (D) mefloquina.
  - (E) piridostigmina.

- 33) O principal exame radiológico a ser realizado no diagnóstico de tromboembolismo pulmonar é:
- (A) a angiografia pulmonar.
  - (B) a TC de tórax helicoidal com contraste.
  - (C) a cintilografia pulmonar.
  - (D) o ecocardiograma bidimensional.
  - (E) a radiografia de tórax.
- 34) Pré-escolar de 3 anos chega ao hospital com quadro de febre há 10 dias. Ao exame físico apresentava: edema das pálpebras, petéquias presentes no palato associado a exsudatos nas amígdalas, adenomegalia cervical anterior e posterior, fígado a 3cm do rebordo costal e baço a 2,5cm do rebordo costal esquerdo. Marque a opção de diagnóstico mais provável.
- (A) Mononucleose infecciosa.
  - (B) Amigdalite estreptocócica.
  - (C) Leucemia linfoblástica aguda.
  - (D) Infecção causada por Adenovírus.
  - (E) Infecção primária por Citomegalovírus.
- 35) A parada cardíaca é tratada em cinco estágios. O primeiro estágio é o Suporte Básico de Vida onde pode-se usar o DEA (Desfibrilador Externo Automático), quando não estamos no ambiente hospitalar. O segundo estágio é o Suporte Avançado de Vida. Uma das atividades realizadas no Suporte Avançado de Vida é a desfibrilação. Marque o ritmo que pode-se desfibrilar:
- (A) Fibrilação atrial aguda,
  - (B) Bradicardia,
  - (C) Fibrilação ventricular,
  - (D) Atividade elétrica sem pulso (AESP),
  - (E) Assistolia.
- 36) O sarampo é uma doença viral com letalidade muito alta antes de um ano de idade. Na década de 1980 á 1990, o sarampo era uma doença de caráter endêmico. Desde que ano o sarampo não circula mais no país?
- (A) 2000
  - (B) 2003
  - (C) 2005
  - (D) 2006
  - (E) 2007

- 37) Paciente procura ambulatório de clínica médica devido a aparecimento de caroço no pescoço, negando qualquer outro sintoma. Após anamnese e exame físico, a hipótese diagnóstica é de nódulo tireoideano. O próximo passo a ser realizado para melhor avaliação é:
- (A) ultrasonografia de tireoide com doppler.
  - (B) observação, sem realização de exames.
  - (C) punção aspirativa por agulha fina.
  - (D) tomografia computadorizada do pescoço.
  - (E) cintilografia tireoideana.
- 38) O esquema vacinal para o primeiro ano de vida, proposto pelo Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, engloba as seguintes vacinas:
- (A) BCG, Hepatite A, Hepatite B, Poliomielite, Rotavírus e Tetravalente.
  - (B) BCG, Hepatite B, Poliomielite, Rotavírus, Tetravalente e Tríplice Viral.
  - (C) Hepatite A, Hepatite B, Poliomielite, Tríplice viral e Meningite.
  - (D) BCG, Hepatite A, Poliomielite, Tríplice viral e Meningite.
  - (E) Hepatite A, Poliomielite, Rotavírus, Tríplice viral e Meningite.
- 39) O Pacto pela Saúde foi formalizado em 2006. Ele se divide em três partes: o Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida tem como uma de suas prioridades:
- (A) a saúde do idoso.
  - (B) o investimento para elaboração de vacinas.
  - (C) o financiamento de obras hospitalares.
  - (D) fornecer Bolsa Família.
  - (E) implantar o Sistema Único de Assistência Social.
- 40) Quais dos Critérios de Duke abaixo, é considerado principal para o diagnóstico da endocardite bacteriana?
- (A) Febre.
  - (B) Hemocultura positiva.
  - (C) Lesões de Janeway.
  - (D) Nódulos de Osler.
  - (E) Aneurisma Micótico.

41) Lupus Eritematoso Sistêmico é uma doença autoimune diagnosticada por meio de elementos clínicos e auto anticorpos característicos, a manifestação mais grave da doença é a:

- (A) pericardite.
- (B) poliartrite não erosiva.
- (C) anemia hemolítica.
- (D) nefrite.
- (E) pleurite.

42) Correlacione as causas de infertilidade conjugal.

- I - Fator masculino ( ) Hidrossalpinge.
- II - Distúrbios ovulatórios ( ) Azoospermia.
- III- Fator tubário ( ) Síndrome de Asherman.
- IV - Fator uterino ( ) Síndrome do Ovário Policístico.

Marque a opção que apresenta a sequência correta.

- (A) (II) (I) (III) (IV)
- (B) (III) (II) (IV) (I)
- (C) (III) (I) (II) (IV)
- (D) (III) (I) (IV) (II)
- (E) (II) (I) (IV) (III)

43) Paciente 25 anos deu entrada na emergência do hospital relatando que há dois dias iniciou quadro abrupto de dor intensa e vermelhidão em membro inferior direito, com margens bem definidas, associado a isso apresentava febre alta e prostração. O esquema antibiótico venoso de primeira escolha para tratamento deste paciente é:

- (A) ciprofloxacino.
- (B) oxacilina.
- (C) ampicilina.
- (D) penicilina cristalina.
- (E) metronidazol.

- 44) As manifestações clínicas da alergia alimentar dependem de vários fatores, um deles é o mecanismo imunológico da imunoglobulina IgE, que está envolvida nas seguintes manifestações clínicas:
- (A) broncoespasmo, urticária, angioedema.
  - (B) asma, urticária, dermatite de contato.
  - (C) broncoespasmo, rinite, proctocolite.
  - (D) gastroenterite eosinofílica, choque anafilático, proctocolite.
  - (E) enterocolite, hemossiderose pulmonar, dermatite herpetiforme.
- 45) Em todo o mundo, o câncer de colo uterino ainda é um importante problema de saúde. Assinale abaixo a opção correta:
- (A) O exame colpocitológico ou Papanicolau não detecta precocemente o carcinoma "in situ".
  - (B) O evento inicial na displasia cervical e carcinogênese é a infecção pelo parvovírus b19.
  - (C) O adenocarcinoma é o tipo mais comum de câncer invasivo do colo.
  - (D) A biópsia cônica de colo é uma boa alternativa terapêutica no estágio IV na classificação da FIGO.
  - (E) A radioterapia é uma opção de tratamento em todos os estágios de câncer cervical.
- 46) A Doença Hemolítica Perinatal ou Eritroblastose Fetal pode ocorrer nos casos de incompatibilidade sanguínea materno-fetal com aloimunização materna. Qual medida profilática vem contribuindo para diminuição da mortalidade perinatal nestes casos?
- (A) Amniocentese em todas as gestantes Rh negativas.
  - (B) Uso da imunoglobulina anti-D no pós-parto de mães Rh negativas e recém-nato Rh positivo.
  - (C) Imunoterapia com preparado de linfócitos B paternos.
  - (D) Avaliação da translucência nucal na ultrassonografia do primeiro trimestre.
  - (E) Realização do teste de Coombs direto no pré-natal.

- 47) A síndrome CREST é definida por:
- (A) calcinose cutânea, eritema nodoso, distúrbio de motilidade esofágica, esclerodactilia e telangectasias.
  - (B) fenômeno de Raynaud, distúrbio de motilidade esofágica, esclerodactilia e telangectasias, Eritema nodoso.
  - (C) calcinose Cutânea, Fenômeno Raynaud, distúrbio de motilidade esofágico, esclerodactilia e telangectasias.
  - (D) hiperemia facial em asa de borboleta, Calcinose Cutânea, Fenômeno Raynaud, esclerodactilia e telangectasias.
  - (E) calcinose cutânea, refluxo gastroesofageano, sudorese, e telangectasias e fenômeno de Raynaud.
- 48) Motorista de carro, sem uso de cinto de segurança, traumatizado no abdome, trazido à emergência pela equipe de socorro e atendimento pré-hospitalar, realizou tomografia de abdome e pelve revelando retro-pneumoperitônio à direita. O órgão provavelmente traumatizado é:
- (A) cólon.
  - (B) íleo.
  - (C) jejuno.
  - (D) duodeno.
  - (E) pâncreas.
- 49) A anamnese e o exame físico continuam sendo a ferramenta de maior importância nas hipóteses diagnósticas. A palpação de pulso faz parte do exame físico. Pulso em martelo d'água sugere:
- (A) tamponamento cardíaco.
  - (B) prolapso de valva mitral.
  - (C) fibrilação atrial.
  - (D) insuficiência Aórtica.
  - (E) estenose Mitral.
- 50) Em um trauma Extenso de face, com edema de glote, trauma de traqueia e outras condições impeditivas de intubação endotraqueal, a medida salvadora e transitória, que deve ser executada é a:
- (A) ventilação sob máscara laríngea.
  - (B) traqueostomia.
  - (C) cricotireoidostomia.
  - (D) intubação naso-traqueal.
  - (E) ventilação com ambu.