

MARINHA DO BRASIL
DIRETORIA DE ENSINO DA MARINHA

**(CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AOS
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA (PRM) DO
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS (HNMD) EM
2013)**

**NÃO ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE
MATERIAL EXTRA**

ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

ANESTESIOLOGIA	CIRURGIA GERAL
CLÍNICA MÉDICA	GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
MEDICINA NUCLEAR	NEUROCIRURGIA
NEUROLOGIA	OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	OTORRINOLARINGOLOGIA
PATOLOGIA	PEDIATRIA
PSIQUIATRIA	RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM

- 1) No tratamento cirúrgico do Melanoma Cutâneo primário Estádio I menor que 1mm de espessura está indicada excisão com margens de
- (A) 0,5cm.
 - (B) 1,0cm.
 - (C) 2,0cm sem mapeamento.
 - (D) 2,0cm e mapeamento linfonodo sentinela.
 - (E) 2,0cm e dissecação de linfonodos.
- 2) Os marcadores tumorais CA 125 e alfafetoproteína se referem, respectivamente, a neoplasia de que órgãos abaixo?
- (A) Ovário e mama.
 - (B) Ovário e fígado.
 - (C) Mama e fígado.
 - (D) Pumão e mama.
 - (E) Pâncreas e fígado.
- 3) Paciente primípara com queixa de dor em baixo ventre e sangramento vaginal moderado, gestação compatível com 8 semanas documentado por exame de ultrassonografia realizado na semana anterior. Ao exame: útero globoso, colo dilatado, membrana amniótica herniada. Tal descrição é compatível com abortamento
- (A) inevitável.
 - (B) incompleto.
 - (C) infectado.
 - (D) retido.
 - (E) habitual.
- 4) Qual dos fármacos abaixo é contraindicado para uso durante a amamentação ?
- (A) Haloperidol.
 - (B) Rosiglitazona.
 - (C) Nalbufina.
 - (D) Triantereno
 - (E) Amiodarona.

- 5) Recomenda-se para tratamento da infecção por *Helicobacter pylori* o seguinte esquema:
- (A) subsalicilato de bismuto mais metronidazol mais tetraciclina.
 - (B) subsalicilato de bismuto mais metronidazol mais amoxicilina.
 - (C) omeprazol mais metronidazol mais amoxicilina.
 - (D) ranitidina e citrato de bismuto mais metronidazol mais amoxicilina com clavulanato.
 - (E) lansoprazol mais clindamicina mais azitromicina.
- 6) Qual dos fatores abaixo NÃO é fator de risco para o carcinoma da vesícula biliar?
- (A) Cálculos Biliares.
 - (B) Cistos de Colédoco.
 - (C) Obesidade.
 - (D) Infecção por *Enterococcus* sp.
 - (E) Infecção por *Salmonella* Typhi.
- 7) Qual o distúrbio do sono mais prevalente e persistente da infância?
- (A) Enurese noturna.
 - (B) Insônia.
 - (C) Terror noturno.
 - (D) Narcolepsia.
 - (E) Síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono.
- 8) A mediastinite aguda ocorre devido à
- (A) histoplasmose.
 - (B) tuberculose.
 - (C) sarcoidose.
 - (D) perfuração esofágica.
 - (E) silicose.
- 9) Na febre reumática, as duas valvas cardíacas mais comumente acometidas em ordem de frequência são:
- (A) aórtica e tricúspide.
 - (B) pulmonar e aórtica.
 - (C) tricúspide e pulmonar.
 - (D) tricúspide e mitral.
 - (E) mitral e aórtica.

- 10) Em relação aos fatores de riscos modificáveis cardiovasculares abaixo, qual deles tem risco mais elevado em mulheres?
- (A) Hipercolesterolemia.
 - (B) Estresse.
 - (C) Tabagismo.
 - (D) Inatividade Física.
 - (E) Dieta Não Saudável.
- 11) Paciente que apresenta eritema nodoso, adenopatia hilar bilateral e uveíte anterior sugere o diagnóstico de
- (A) histoplasmose.
 - (B) leishmaniose.
 - (C) tuberculose.
 - (D) sarcoidose.
 - (E) paracoccidioidomicose.
- 12) Em paciente prenha com queixas de dor abdominal, qual é a técnica por imagem considerada teste propedêutico de primeira escolha?
- (A) Rotina Radiológica de Abdome Agudo.
 - (B) Estudo Ultrassonográfico.
 - (C) Tomografia Computadorizada de Abdome e Pelve.
 - (D) Ressonância Nuclear Magnética de Abdome Total.
 - (E) Tomografia por Emissão de pósitrons (PET).
- 13) Dentre as manifestações clínicas do lúpus eritematoso sistêmico (LES) listadas abaixo, qual a de maior prevalência?
- (A) Miopatia/miosite.
 - (B) Síndrome nefrótica.
 - (C) Pleurite, pericardite, derrames.
 - (D) Deformidade das mãos.
 - (E) Anemia.
- 14) Qual dos estudos tem problema de inferência individual?
- (A) De Coorte.
 - (B) De caso-controle
 - (C) Ecológico
 - (D) Transversal
 - (E) Duplo-cego

- 15) Durante o desenvolvimento normal do embrião humano, o intestino médio hernia pelo anel umbilical e continua a crescer. Em qual semana gestacional o intestino médio retorna à cavidade abdominal e executa rotação e fixação normais, juntamente com o fechamento do anel umbilical?
- (A) 5ª
 - (B) 7ª
 - (C) 9ª
 - (D) 11ª
 - (E) 13ª
- 16) Dentre os músculos extrínsecos do Antebraço Volar abaixo, qual deles NÃO é inervado pelo Nervo Mediano?
- (A) Flexor ulnar do punho.
 - (B) Pronador quadrado.
 - (C) Flexor radial do punho.
 - (D) Pronador redondo.
 - (E) Flexor longo do polegar.
- 17) Qual o nome inicial da doença que em 24 de abril de 2009, foi notificada pela Organização Mundial de Saúde e levou o Governo Brasileiro a instituir o Gabinete Permanente de Emergência em Saúde Pública (GPESP) que passou a ser responsável pelo monitoramento e adoção das medidas necessárias ao controle da emergência no país?
- (A) Febre das Montanhas Rochosas.
 - (B) Gripe Suína.
 - (C) Gripe Aviária.
 - (D) Mal da Vaca Louca.
 - (E) Febre do Nilo.
- 18) O perfil líquórico que apresenta pleocitose linfocitária, nível normal ou pouco elevado de proteína, nível de glicose normal e pressão de abertura normal ou algo aumentada fala a favor de qual agente etiológico?
- (A) Pseudomonas aeruginosa.
 - (B) Neisseria meningitidis.
 - (C) Vírus.
 - (D) Streptococcus pneumoniae.
 - (E) Staphylococcus spp.

- 19) Que vacinas a gestante deve ter atualizadas durante o pré-natal?
- (A) Dupla tipo adulto e febre amarela.
 - (B) Dupla tipo adulto e meningocócica.
 - (C) Hepatite B e febre amarela.
 - (D) Hepatite B e dupla tipo adulto.
 - (E) Dupla tipo adulto e tríplice viral.
- 20) É uma contraindicação absoluta ao uso dos agentes fibrinolíticos no infarto agudo do miocárdio:
- (A) hipertensão arterial grave (PA maior que 180 por 110 mmHg).
 - (B) doença ulcerosa péptica ativa.
 - (C) uso de anticoagulantes.
 - (D) procedimento cirúrgico ou invasivo recente (com menos de 02 semanas).
 - (E) reanimação cardiopulmonar prolongada (mais de 10 minutos).
- 21) Quanto ao Tumor Filóides da mama é correto afirmar que
- (A) a maioria deles é maligna.
 - (B) lesões bilaterais são comuns.
 - (C) o tratamento consiste na excisão ampla da lesão.
 - (D) não faz diagnóstico diferencial com fibroadenoma.
 - (E) o diagnóstico pode ser feito por imagem.
- 22) Dentre as taxas de mortalidade ajustadas pela idade entre idosos brasileiros (1980, 2005), qual dos grupos abaixo apresenta maior incidência atualmente?
- (A) Doença Isquêmica do coração.
 - (B) Doenças cerebrovasculares.
 - (C) Neoplasia maligna (todas).
 - (D) Câncer de traquéia, brônquios e pulmões (homens).
 - (E) Câncer de Mama (mulheres).
- 23) Qual o achado cardiológico mais frequente em pacientes portadores de lúpus neonatal ?
- (A) Bloqueio atrioventricular de 3° grau.
 - (B) Miocardite.
 - (C) Derrame pericárdico.
 - (D) Forame oval pérvio.
 - (E) Displasia ventricular.

Prova : Amarela
Profissão : ESPECIALIDADES COM ACESSO DIRETO

Concurso : PRM/2013

- 24) A glomerulonefrite membranoproliferativa tipo III está comumente associada
- (A) a hepatite B.
 - (B) a crioglobulinemia mista.
 - (C) a lipodistrofia parcial.
 - (D) ao câncer de pulmão, mama e ovário.
 - (E) a deficiência do receptor do complemento.
- 25) O estudo de coorte se caracteriza por análise
- (A) de um grupo de pessoas em um ponto particular do tempo, sendo investigadas informações de intervenções (passadas ou presentes) e de resultados atuais de saúde, para examinar associações entre o resultado e a intervenção.
 - (B) de um grupo definido de indivíduos que é seguido no tempo para examinar associações entre diferentes intervenções recebidas e os resultados subsequentes.
 - (C) que coleta observações em uma série de indivíduos, em geral todos recebendo a mesma intervenção, antes e depois, mas sem um grupo controle.
 - (D) que utiliza um grupo com um resultado de interesse e pessoas provenientes da mesma população fonte, mas sem o resultado são estudadas, para examinar a associação entre o resultado e uma intervenção prévia.
 - (E) na qual observações são feitas antes e depois da implementação de uma intervenção, tanto no grupo que recebeu como no grupo que não recebeu a intervenção, usado para comparação.
- 26) Segundo o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), baseado em dados de 2006, considerando o sexo feminino, qual a principal causa de internação hospitalar na faixa etária de 10 a 19 anos?
- (A) Doenças do aparelho respiratório.
 - (B) Neoplasias.
 - (C) Gravidez, parto e puerpério.
 - (D) Causas externas.
 - (E) Doenças do aparelho digestivo.

- 27) Paciente jovem, vítima de trauma, atendido em via pública por ambulância do Corpo de Bombeiros. Na avaliação inicial, pela Escala de Coma de Glasgow, apresentava respostas verbais inadequadas, resposta motora de retirada do membro aos estímulos dolorosos e abertura ocular ao estímulo doloroso. Face ao exposto, qual a pontuação nesta Escala?
- (A) 3
 - (B) 5
 - (C) 7
 - (D) 9
 - (E) 11
- 28) Nas gestantes com pré-eclampsia é considerado tratamento e profilaxia das convulsões o uso de sulfato de magnésio. São considerados parâmetros clínicos de intoxicação:
- (A) reflexo tendinoso, diurese, frequência cardíaca.
 - (B) midríase e frequência respiratória.
 - (C) frequência cardíaca e tremor.
 - (D) reflexo tendinoso, diurese, frequência respiratória.
 - (E) tremor, rubor, diurese.
- 29) Qual famoso cirurgião preconizou a ligadura dupla dos vasos sanguíneos de uma amputação, no lugar da cauterização com óleo fervente?
- (A) Andreas Versalius (1514-1564).
 - (B) Ambroise Paré (1510-1590).
 - (C) Willian T. G. Morton (1819-1868).
 - (D) Joseph Lister (1827-1912).
 - (E) John Hunter (1728-1793).
- 30) O risco relativo é uma medida de avaliação de benefício ou impacto de um tratamento ou medida preventiva e tem como definição:
- (A) razão entre a incidência de eventos dos tratados e dos não tratados.
 - (B) proporção de eventos que deixam de ocorrer com o tratamento.
 - (C) número de eventos que deixam de acontecer nos indivíduos tratados.
 - (D) número de indivíduos a serem tratados por determinado tempo para evitar um evento.
 - (E) razão entre a incidência do número de eventos que deixam de acontecer e dos não tratados.

- 31) Dentre as opções abaixo, qual NÃO necessita profilaxia para estreptococo Beta-hemolitico do grupo B de Lancefield?
- (A) Cultura vaginorretal positiva colhida 35-37 semanas.
 - (B) Amniorrexe prematura antes de 37 semanas.
 - (C) Feto anterior com doença streptocócica invasiva.
 - (D) Aminiorrexe acima de 18h.
 - (E) Cultura vaginorretal negativa colhida entre 35-37 semanas.
- 32) Segundo dados da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) em 2010, a respeito do consumo de substâncias psicoativas lícitas entre os universitários brasileiros, podemos afirmar que as duas substâncias mais prevalentes foram:
- (A) álcool e analgésicos opiáceos.
 - (B) inalantes/solventes e produtos do tabaco.
 - (C) tranquilizantes/ansiolíticos e esteróides anabolizantes.
 - (D) álcool e maconha.
 - (E) álcool e produtos do tabaco.
- 33) Quando utilizamos a expressão: "medicina baseada em evidências" e consideramos o sistema de GRADE, podemos afirmar que ele serve para
- (A) definir os vieses de um estudo.
 - (B) classificar os estudos em observacionais e experimentais.
 - (C) qualificar as instituições de pesquisa.
 - (D) definir o grau de recomendação e qualidade de evidência científica de um estudo.
 - (E) verificar as implicações econômicas, ambientais, sócio-políticas e legais de um estudo.

- 34) Paciente de 40 anos realizou mamografia de rotina que descreve nódulo de 1,5 cm de contorno parcialmente definido, no QSE de mama esquerda, classificado como BIRADS-0. Realizou complementação com USG mamária que descreve imagem anecóica, regular, de limites bem definidos de 12 x 8 mm, no QSE da mama esquerda correspondente a área descrita na mamografia. Sem história familiar de câncer de mama ou ovário e exame físico normal. Qual seria a melhor conduta frente ao caso?
- (A) Solicitar ressonância nuclear magnética.
 - (B) Biópsia por agulha grossa.
 - (C) Punção aspirativa por agulha fina.
 - (D) Seguimento anual.
 - (E) biópsia excisional por estereotaxia.
- 35) O EDTA cálcio é indicado como antídoto na intoxicação exógena por
- (A) paracetamol.
 - (B) benzodiazepínicos.
 - (C) metais pesados.
 - (D) digitálicos.
 - (E) opiáceos.
- 36) A Zona Medial do Reto possui drenagem linfática para os gânglios
- (A) inguinais.
 - (B) ilíacos internos.
 - (C) da artéria mesentérica superior.
 - (D) da artéria mesentérica inferior.
 - (E) da artéria cólica média.
- 37) Mulher de 60 anos, IMC = 30, menopausa há 10 anos, apresenta sangramento genital. NÃO faz parte do diagnóstico diferencial:
- (A) vaginite atrófica.
 - (B) hiperplasia endometrial.
 - (C) câncer de endométrio.
 - (D) câncer de colo do útero.
 - (E) leiomiomatose uterina.

- 38) A diarreia aguda na infância pode ser causada por diversos agentes etiológicos, dentre estes, as bactérias. Assinale abaixo aquela que causa um quadro de adenite mesentérica, simulando apendicite aguda.
- (A) Shigella sp.
 - (B) Campylobacter sp.
 - (C) Yersinia sp.
 - (D) Salmonella sp.
 - (E) Vibrio cholerae.
- 39) Qual a cardiopatia congênita que mais frequentemente se manifesta com insuficiência cardíaca na infância?
- (A) Persistência do canal arterial.
 - (B) Defeito do septo atrioventricular.
 - (C) Coarctação da aorta.
 - (D) Transposição dos grandes vasos da base.
 - (E) Comunicação interventricular.
- 40) O tumor sólido mais comum entre os lactentes é o
- (A) retinoblastoma.
 - (B) neuroblastoma.
 - (C) osteossarcoma.
 - (D) tumor de wilms.
 - (E) hepatoblastoma.
- 41) Qual das opções abaixo NÃO é causa de Íleo?
- (A) Uso de drogas (antihistamínicos, opiáceos).
 - (B) Causas metabólicas (uremia, coma diabético).
 - (C) Íleo biliar (fístula biliodigestiva).
 - (D) Causas neurogênicas (trauma raqui-medular).
 - (E) Causas infecciosas (peritonite, sepse pulmonar).
- 42) Qual o tratamento de escolha da vaginose bacteriana na gestação para prevenção de parto prematuro?
- (A) Metronidazol.
 - (B) Levofloxacino.
 - (C) Ciprofloxacina.
 - (D) Ceftriaxone.
 - (E) Clindamicina.

- 43) Quanto ao tratamento do câncer de colo uterino, podemos afirmar que
- (A) quando houver dilatação ureteral evidenciada por ultrasonografia, a histerectomia radical será a melhor opção de tratamento.
 - (B) o comprometimento da vagina contraindica o tratamento cirúrgico.
 - (C) nos tumores com invasão menor ou igual a 3 mm de profundidade e 5 mm de extensão, a conização pode ser uma opção de tratamento.
 - (D) a radioterapia deve ser sempre indicada como complemento ao tratamento cirúrgico.
 - (E) a quimioterapia como tratamento isolado se mostra superior à associação com radioterapia.
- 44) Os sinais e sintomas abaixo podem ser observados em crianças vítimas de BULLYING, EXCETO:
- (A) vômitos.
 - (B) cianose.
 - (C) síndrome do intestino irritável.
 - (D) enurese noturna.
 - (E) hiperventilação.
- 45) Gestante de 32 anos, primípara chega à maternidade em trabalho de parto. No momento da internação, considerando o toque vaginal, qual das situações abaixo configura indicação para o uso de misoprostol?
- (A) Dilatação 4cm, 60% apagamento, 0 DeLee, firme, anterior.
 - (B) Dilatação 2cm, 50% apagamento, -2 DeLee, médio, posterior.
 - (C) Dilatação 5cm, 20% apagamento, +1 DeLee, médio, médio.
 - (D) Dilatação 1cm, 80% apagamento, 0 DeLee, mole, anterior.
 - (E) Dilatação 2cm, 50% apagamento, +1 DeLee, mole, posterior.

- 46) Paciente de 28 anos procura emergência do hospital com dor na vulva. Ao exame físico: úlcera em grande lábio esquerdo de bordo irregular e profunda e linfadenomegalia inguinal dolorosa. O diagnóstico provável e tratamento medicamentoso a ser prescrito é
- (A) herpes/aciclovir.
 - (B) sífilis/penicilina.
 - (C) abscesso/cefalexina.
 - (D) donovanose/clindamicina.
 - (E) cancróide/azitromicina.
- 47) A Pancreatite tropical ou nutricional, relacionada à forma hereditária causada por mutações nos genes que codificam inibidores pancreáticos da secreção de tripsina, acomete particularmente que populações?
- (A) Leste Europeu.
 - (B) América Central.
 - (C) Indonésia.
 - (D) África.
 - (E) América do Sul.
- 48) O escorbuto é o principal achado clínico na deficiência de qual vitamina?
- (A) Vitamina C.
 - (B) Tiamina.
 - (C) Riboflavina.
 - (D) Folato.
 - (E) Vitamina D.
- 49) É causa de hipertensão portal pré hepática:
- (A) síndrome de Budd Chiari.
 - (B) obstrução sinusoidal hepática.
 - (C) miocardiopatia restritiva.
 - (D) síndrome de Banti.
 - (E) esquistossomose.
- 50) Assinale a opção que NÃO representa uma das principais causas de hidronefrose fetal.
- (A) Fimose.
 - (B) Refluxo vesicoureteral.
 - (C) Válvula de uretra posterior.
 - (D) Hidrocolpos.
 - (E) Síndrome de Prune-Belly.