

Gabarito Provisório – Prova Pré-Requisito Clínica Médica 2015

Questão	Alternativa	Texto da alternativa
01	A	Anemia; verificar a causa da anemia e tratá-la
02	E	Diagnóstico em crianças com idade inferior a 18 meses.
03	C	Pneumonia fúngica por <i>Pneumocystis jirovecii</i> e tratamento com Sulfametoxazol + trimetoprima.
04	D	Febre do Nilo Ocidental
05	B	A reposição volêmica precoce e adequada não é um fator determinante para a prevenção de fenômenos hemorrágicos, principalmente ligados à coagulopatia de consumo.
06	C	Coleta de exame diagnóstico por método sorológico e virológico, tratamento inicial com paracetamol, hidratação e internação hospitalar.
07	A	As revisões sistemáticas de estudos de coorte apresentam nível de evidência I para avaliar fatores de risco.
08	B	Há evidente nexo causal para se firmar o diagnóstico de dermatose ocupacional.
09	E	Os anticolinérgicos devem ser prescritos para tratamento do prostatismo, pois melhoram o fluxo urinário.
10	E	A cardiopatia reumática permanece, no Brasil, como a terceira maior causa de doença cardíaca entre crianças e adultos jovens.
11	C	Inibidor da Na ⁺ /K ⁺ ATPase.
12	A	Síndrome Cardiorrenal Aguda - Tipo 1.
13	D	Comunicação interatrial.
14	E	As afirmativas I, II e III estão corretas.
15	A	Derrame pericárdico com tamponamento cardíaco
16	A	Ramipril
17	E	O carcinoma epidermóide de esôfago é uma neoplasia esofágica comum no nosso meio, tendo como principais fatores de risco o etilismo e o tabaco. Há um aumento na incidência de casos de adenocarcinoma esofágico em países ocidentais, e a sua associação com o esôfago de Barret é bem estabelecida.
18	C	Solicitar avaliação da Oftalmologia para visualizar anéis de Kayser-Fleischer/Doença de Wilson.
19	C	Dentre os métodos de imagem, o ultrassom representa o método mais prático e simples para esse diagnóstico, especialmente quando a esteatose excede 30%. Para esteatoses menos intensas (5 a 30%), a ressonância magnética (RM) com espectroscopia ou a RM de última geração (dual gradient) são métodos mais sensíveis.
20	B	A cirrose secundária a hepatite C é a causa mais comum de transplante no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.
21	A	LES e artropatia de Jaccoud.
22	C	Anti-UI-RNP
23	E	Inflamação cutânea ao redor dos clássicos "trigger-points"
24	D	O anti-DNA nativo tem valor diagnóstico no LES e se relaciona com atividade da doença.

Questão	Alternativa	Texto da alternativa
25	C	Tipicamente, a dispnéia não ocorre até que o VEF1 seja cerca de 50% do normal, quando a doença já pode estar presente por décadas.
26	A	Iniciar antibioticoterapia empírica prontamente por se tratar de pneumonia hospitalar.
27	C	Os carcinomas epidermóides originam-se nos brônquios e envolvem os lobos pulmonares e o brônquio fonte por extensão, sendo reconhecidos histologicamente pelas pontes intercelulares, formação perolácea e pelo processo de queratinização celular.
28	B	Pode ocorrer por perda de cargas positivas na parede glomerular.
29	D	Não há necessidade de administrar baixas doses de bicarbonato oral, uso contínuo, para corrigir a acidose metabólica.
30	D	Evolui com consumo de complemento (hipocomplementemia).
31	D	Os achados laboratoriais mais comuns são teste da antiglobulina direto positivo, DHL (desidrogenase láctica) elevado, haptoglobina elevado, reticulócitos elevado e bilirrubina indireta elevada.
32	C	Hemofilia é a principal hipótese para recém nascidos que apresentam: grande cefalohematoma, TP normal e TTPA alargado.
33	D	Púrpura trombocitopênica imunológica
34	B	citogenética ou qualquer técnica capaz de detectar a t(15;17) ou o gene híbrido PML-RAR
35	C	V-V-V-F-F
36	E	No câncer colo-retal hereditário não polipose (CCHNP), a sobrevida é comparativamente melhor em relação aos casos esporádicos, em parte devido à apresentação tumoral menos avançada e, mesmo comparações estágio a estágio, demonstraram vantagem de sobrevida em CCHNP sobre pacientes com câncer colorectal esporádico no estágio III.
37	A	cintilografia óssea, radiografia simples e fosfatase alcalina
38	B	Apenas a afirmativa I está correta.
39	C	Pacientes assintomáticos geralmente têm tumores pequenos e são mais bem diagnosticados pela dosagem de catecolaminas no sangue.
40	C	os valores séricos elevados de triglicérides resultam em alterações nas partículas de LDL, que se tornam menores e mais aterogênicas.
41	E	Redução da resistência vascular periférica.
42	E	Síndrome de Sjögren e bronquiectasias.
43	D	If a patient does not have a prompt response to a beta-lactam, a macrolide or doxycycline can be substituted to treat a possible atypical bacterial infection, such as that caused by <i>Myc. Pneumoniae</i> .
44	C	A infecção por <i>Klebsiella</i> tende a ocorrer nos lobos superiores, enquanto nos abscessos provocados por agentes anaeróbios e gram negativos, <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Mycobacterium tuberculosis</i> , existe frequentemente derrame pleural associado à cavitação.
45	C	histopatologia
46	D	d) A isotretinoína oral não altera o perfil lipídico
47	D	O exame clínico pode indicar o diagnóstico e o início do tratamento.
48	D	Escama
49	A	A lesão ocorre no primeiro contato e dura menos de 6 semanas.
50	D	A vasculopatia tem sido considerada como o fator preponderante na gênese das ulcerações das extremidades no diabetes, geralmente associada a algum grau de neuropatia.