

## EXAME AMRIGS/ACM 2015

### RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: **PSIQUIATRIA**

#### Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem o Exame AMRIGS e ACM.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta de material transparente esferográfica de cor azul ou preta, lápis, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Verifique se o pré-requisito constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 4h de início da prova.
7. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a capa da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no site da AMRIGS e ACM a prova padrão.
8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
10. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no Cronograma de Execução desse Exame.
12. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!



# Espaço para anotação dos gabaritos

Questão	Gabarito
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	

Questão	Gabarito
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

QUESTÃO 01 – São complicações médicas da anorexia nervosa, EXCETO:

- A) Carotenemia.
- B) Hipercolesterolemia.
- C) Acidose hipocalêmica.
- D) Arritmia cardíaca.
- E) Leucopenia.

QUESTÃO 02 – Em relação aos problemas do sono, é correto afirmar que:

- A) A polissonografia deve ser rotineiramente indicada para a avaliação de insônia.
- B) A insônia está associada a desempenho profissional insatisfatório e uso aumentado de álcool.
- C) As alucinações hipnagógicas e hipnopômicas são geralmente uma manifestação do sono não REM.
- D) O tratamento da narcolepsia envolve, primariamente, o uso de inibidores seletivos da recaptção de serotonina.
- E) Transtornos do sono são encontrados em até 30% dos pacientes com Episódio Depressivo Maior.

QUESTÃO 03 – Em relação às parafilias, é correto afirmar que:

- A) No Transtorno Fetichista, o indivíduo apresenta intensa excitação sexual resultante de tocar ou esfregar-se em pessoa que não consentiu com essa conduta.
- B) Raramente, o mesmo indivíduo apresenta duas ou mais parafilias.
- C) A insatisfação com o gênero “de nascimento” caracteriza o Transtorno Transvêstico.
- D) Para o estabelecimento do diagnóstico do Transtorno Voyeurista, é necessário que o paciente excite-se sexualmente ao expor os próprios genitais a uma pessoa que não espera o fato.
- E) No diagnóstico do Transtorno Pedofílico, o indivíduo deve ter, no mínimo, 16 anos de idade e ser pelo menos 5 anos mais velho que a criança com a qual tem fantasias sexualmente excitantes.

QUESTÃO 04 – Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que:

- A) Apesar de sua prevalência ser de aproximadamente 5% em crianças, o TDAH é observado em menos de 1% dos adultos.
- B) Problemas no desempenho acadêmico dos indivíduos com TDAH não ocorrem na ausência de um transtorno específico da aprendizagem.
- C) Crianças com TDAH apresentam uma maior probabilidade do que seus pares para desenvolver Transtorno da Personalidade Antissocial na idade adulta.
- D) O tabagismo na gestação não se correlaciona com maiores prevalências de TDAH.
- E) Mesmo se os sintomas de desatenção e hiperatividade ocorrerem apenas durante o curso de um transtorno psicótico, o diagnóstico de TDAH deve ser considerado presente.

QUESTÃO 05 – Sobre o Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), analise as assertivas abaixo:

- I. Os principais padrões de sintomatologia do TOC são contaminação, dúvida patológica, pensamentos intrusivos e simetria.
- II. Acredita-se que exista uma síndrome obsessiva compulsiva com início na infância, relacionada a um processo autoimune secundário à infecção estreptocócica.
- III. As obsessões são caracterizadas por comportamentos repetitivos e padronizados.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 06 – Em relação às demências, é correto afirmar que:

- A) As duas causas mais comuns de demência são a Doença de Alzheimer e a Degeneração Frontotemporal.
- B) Na Doença de Huntington, existe uma alta incidência de depressão, que costuma anteceder os movimentos coreoatetoides.
- C) Hipersexualidade e hiperoralidade são sintomas característicos da Demência dos Corpos de Lewy.
- D) Na pseudodemência, os pacientes comumente queixam-se pouco e vagamente das perdas cognitivas.
- E) Um paciente com afasia, apraxia e déficit na função executiva pode ser diagnosticado com Doença de Alzheimer, mesmo na ausência de um déficit de memória.

QUESTÃO 07 – Paciente com 52 anos, hospitalizado após realização de cirurgia, desenvolve quadro de flutuação no nível de consciência, desorientação temporal, dificuldade de atenção, agitação psicomotora, delírios paranoides e alucinações visuais. Em relação ao quadro exposto, assinale a alternativa correta.

- A) Benzodiazepínicos são contraindicados, independentemente da causa do delirium.
- B) O eletroencefalograma não apresenta utilidade na avaliação do delirium.
- C) O desenvolvimento dos sintomas apresentados pelo paciente não altera seu prognóstico.
- D) O tratamento principal é realizado com antipsicótico de baixa potência.
- E) Fatores associados com maior risco para o desenvolvimento do delirium incluem uso de múltiplas drogas e distúrbios metabólicos.

QUESTÃO 08 – Em relação ao Lítio, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Está indicado em todas as fases do Transtorno de Humor Bipolar.
- B) Seu uso durante a gravidez está associado à malformação de Ebstein no recém-nascido.
- C) Hipotireoidismo, glomerulopatia e hipotensão estão entre as reações adversas mais comuns com seu uso.
- D) Insuficiência renal grave e bradicardia sinusal são contraindicações para seu uso.
- E) As manifestações mais precoces de intoxicação são disartria, ataxia e tremor grosseiro.

QUESTÃO 09 – Um homem, adulto jovem, chega na emergência psiquiátrica trazido pelos familiares. Queixa-se de estar ouvindo vozes que lhe dão ordens para fazer “coisas más”. Também relata que frequentemente ouve duas ou mais vozes falando entre elas sobre seu comportamento. Ao exame, apresenta-se com má higiene e embotamento afetivo. Das medicações abaixo, qual a mais indicada no manejo dos sintomas do paciente?

- A) Diazepam.
- B) Fluoxetina.
- C) Risperidona.
- D) Ácido Valproico.
- E) Prometazina.

QUESTÃO 10 – Paciente do sexo feminino vem para atendimento psiquiátrico 4 meses após ter sido vítima de estupro. Quais dos fatores abaixo são mais prováveis de serem encontrados?

- A) Hipervigilância, evitações e lembranças intrusivas.
- B) Flashbacks, hipomania e insônia.
- C) Sonhos angustiantes, irritabilidade e alucinações auditivas.
- D) Amnésia dissociativa, problemas de concentração e abuso de drogas.
- E) Culpa persistente, despersonalização e flutuação do nível de consciência.

QUESTÃO 11 – O Transtorno da Compulsão Alimentar caracteriza-se por:

- A) Uso crônico de laxantes e diuréticos para controle do peso.
- B) Sensação de descontrole sobre a ingestão de alimentos durante episódio de compulsão alimentar.
- C) Distorção da imagem corporal em relação ao peso ou forma do corpo.
- D) Indução de vômitos após episódio de compulsão alimentar.
- E) Prática de atividade física excessiva para compensar possível ganho de peso.

QUESTÃO 12 – O Transtorno de Ansiedade Generalizada caracteriza-se por:

- A) Preocupação excessiva e apreensiva de que possa ocorrer um ataque de pânico.
- B) Sentir-se embaraçado por expor-se a situações em que possa ser avaliado ou criticado.
- C) Medo irracional de doenças e contaminações.
- D) Preocupação excessiva e incontrolável em diferentes eventos e atividades.
- E) Preocupações excessivas desencadeadas por obsessões.

QUESTÃO 13 – Qual dos fatores abaixo sugere maior risco de suicídio?

- A) Sexo feminino.
- B) Adulto jovem.
- C) Ausência de tentativa de suicídio prévia.
- D) Abuso ativo de substâncias.
- E) Hipocondria.

QUESTÃO 14 – São considerados sintomas negativos da Esquizofrenia:

- A) Alucinações auditivas.
- B) Delírios somáticos.
- C) Comportamento bizarro, repetitivo ou estereotipado.
- D) Embotamento afetivo.
- E) Incoerência e ilogicidade do pensamento.

QUESTÃO 15 – Em relação à Depressão Maior, é correto afirmar que:

- A) A depressão é a doença médica mais onerosa para a sociedade.
- B) A depressão é a quarta causa mais importante de incapacitação.
- C) Indivíduos deprimidos costumam passar menos tempo no leito do que pacientes hipertensos e diabéticos.
- D) A depressão leva a uma incapacidade funcional maior do que a de doenças cardíacas.
- E) Os profissionais de atenção primária despendem mais tempo tratando diabetes e hipertensão do que depressão.

QUESTÃO 16 – Qual das alternativas abaixo está mais relacionada com a Depressão Bipolar?

- A) Início tardio dos episódios de humor.
- B) Insônia.
- C) Menor risco de suicídio.
- D) História familiar de depressão maior.
- E) Presença de retardo psicomotor e letargia.

QUESTÃO 17 – São características do Transtorno de Personalidade Antissocial:

- A) Distanciamento das relações sociais e faixa restrita de expressão de emoções.
- B) Recorrência de comportamento automutilante.
- C) Teatralidade e expressão emocional exagerada.
- D) Ausência de remorso e desconsideração dos direitos das outras pessoas.
- E) Esforço frenético para evitar o abandono real ou imaginado.

QUESTÃO 18 – Em relação ao diagnóstico de Transtorno Depressivo Persistente (Distímia), é correto afirmar que:

- A) O humor deprimido ocorre sazonalmente, geralmente com piora nos meses de inverno.
- B) Delírios hipocondríacos fazem parte dos critérios diagnósticos.
- C) Os episódios de humor depressivo podem ocorrer em alternância com episódios de humor eufórico.
- D) Os sintomas depressivos podem ser secundários ao hipotireoidismo.
- E) Sintomas como fadiga e baixa autoestima fazem parte do quadro clínico.

QUESTÃO 19 – São características do Transtorno de Personalidade Narcisista:

- I. Comportamentos arrogantes e insolentes.
- II. Tirar vantagem em relações interpessoais em nome dos próprios interesses.
- III. Crença de ser especial e único.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 20 – É considerado um fator de bom prognóstico na Esquizofrenia:

- A) História familiar negativa para esquizofrenia.
- B) Início dos sintomas em pessoa jovem.
- C) Sexo masculino.
- D) Ausência de sintomas afetivos.
- E) Início insidioso dos sintomas.

QUESTÃO 21 – Em relação ao Transtorno Factício, analise as assertivas abaixo:

- I. A falsificação de sintomas ocorre na busca de ganhos financeiros.
- II. A produção de sinais e sintomas ocorre de forma intencional.
- III. A motivação para o comportamento consiste em convencer a equipe de saúde de que está apto a receber alta hospitalar.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas II e III.

QUESTÃO 22 – Um paciente vem para o atendimento informando ter inalado cocaína em grande quantidade há aproximadamente uma hora. Ao exame, qual dos achados abaixo é o MENOS provável de estar presente?

- A) Taquicardia.
- B) Miose.
- C) Hipertensão.
- D) Calafrios.
- E) Evidências de perda de peso.

QUESTÃO 23 – Homem de 55 anos é trazido à emergência psiquiátrica por desconhecidos. Apresenta-se confuso, com dificuldade para responder às perguntas e para deambular, oftalmoplegia e percebe-se facilmente que o paciente está com cheiro de álcool. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta.

- A) A conduta médica inicial deve ser a de prescrição de glicose EV.
- B) A provável causa do quadro clínico apresentado é depleção crônica de Vitamina B12.
- C) Se não tratado adequadamente, o paciente poderá evoluir para uma síndrome amnésica com o sintoma típico de confabulação.
- D) Uma das causas de não resposta ao tratamento é a hiponatremia.
- E) A mortalidade em casos como esse aproxima-se de 50%.

QUESTÃO 24 – Paciente, 35 anos, queixa-se de ter medo muito intenso para falar em público, devido ao receio de ser avaliado ou humilhado. Percebe que fica ansioso de forma desproporcional nessas situações. Relata que em um episódio em que necessitou falar para um grupo de 10 pessoas desenvolveu quadro caracterizado por taquicardia, sudorese, sensação de sufocamento, “formigamento” nas mãos e medo de “enlouquecer”. Qual o diagnóstico mais provável desse paciente?

- A) Transtorno de Pânico.
- B) Fobia Específica.
- C) Transtorno de Ansiedade Social.
- D) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- E) Agorafobia.

QUESTÃO 25 – Paciente, 70 anos, diabético, com hipertensão arterial sistêmica, sofreu acidente vascular cerebral isquêmico com o desenvolvimento de Síndrome Depressiva após o incidente. Nessa situação, qual é o antidepressivo mais indicado?

- A) Amitriptilina.
- B) Venlafaxina.
- C) Bupropiona.
- D) Citalopram.
- E) Tranilcipromina.

QUESTÃO 26 – Sobre a Esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- A) A minoria dos pacientes apresenta curso crônico do transtorno.
- B) Suicídios são muito raros.
- C) As alucinações mais comuns são as visuais.
- D) Os pacientes podem apresentar sintomas negativos como embotamento afetivo e anedonia.
- E) A doença acomete cerca de 5% da população.

QUESTÃO 27 – Considerando os transtornos pelo uso de substâncias, assinale a alternativa correta.

- A) O uso agudo de cocaína gera bradicardia e hipotensão.
- B) O crack apresenta início de ação cerca de 15 minutos após o uso.
- C) Não há risco de intoxicação com o uso de ecstasy.
- D) Benzodiazepínicos de meia-vida longa podem ser suspensos abruptamente sem risco de abstinência.
- E) O uso da maconha pode levar à dependência.

QUESTÃO 28 – Assinale a alternativa que apresenta elementos centrais de um episódio maníaco.

- A) Perfeccionismo, colecionismo e asseio.
- B) Excentricidade, indiferença e isolacionismo.
- C) Grandiosidade, pressão de fala e fuga de ideias.
- D) Dramaticidade, intimidade forçada e ausência de empatia.
- E) Alucinações auditivas, ideias paranoides e conduta bizarra.

QUESTÃO 29 – Paciente masculino, 35 anos, chega à emergência bastante agitado, falando rapidamente, com fuga de ideias e autoestima elevada. Os familiares que o acompanham referem que ele está fazendo gastos excessivos, não dorme há 3 dias e vem agitado e agressivo há 2 semanas. Familiares relatam também que o paciente estava bastante deprimido e havia iniciado uma medicação antidepressiva há cerca de 4 semanas. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Transtorno bipolar episódio maníaco.
- B) Intoxicação pelo antidepressivo.
- C) Crise aguda de ansiedade.
- D) Esquizofrenia.
- E) Transtorno de Personalidade Borderline.

QUESTÃO 30 – Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina são medicações de amplo uso para o tratamento de transtornos depressivos e de ansiedade. Fazem parte dessa classe de medicamentos:

- A) Topiramato, nefazodona e fluoxetina.
- B) Citalopran, fluvoxamina e sertralina.
- C) Quetiapina, ziprasidona e sibutramina.
- D) Metadona, tranilcipromina e lítio.
- E) Bupropiona, clorpromazina e amitriptilina.

QUESTÃO 31 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o autor à teoria correspondente.

Coluna 1

- 1. Sigmund Freud.
- 2. Melanie Klein.
- 3. Wilfred Bion.
- 4. Donald Winnicot.

Coluna 2

- ( ) Desenvolveu a noção de objeto transicional.
- ( ) Posição depressiva e esquizoparanoide.
- ( ) Teoria das pulsões.
- ( ) Teoria do continente-conteúdo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 2 – 3 – 4.
- B) 2 – 3 – 1 – 4.
- C) 3 – 1 – 4 – 2.
- D) 2 – 1 – 4 – 3.
- E) 4 – 2 – 1 – 3.

QUESTÃO 32 – Paciente masculino, 35 anos, com diagnóstico de episódio depressivo maior em uso de citalopram na dose de 20 mg/dia há 6 semanas sem apresentar efeitos colaterais. Apresenta resposta parcial dos sintomas com uso da medicação. Qual a conduta mais apropriada do ponto de vista farmacológico?

- A) Substituição da medicação por amitriptilina 75 mg/dia.
- B) Potencializar o tratamento com uso de lítio.
- C) Aumentar a dose de citalopram.
- D) Substituir por venlafaxina 150 mg.
- E) Associar com nortriptilina 25 mg.

QUESTÃO 33 – Em relação aos transtornos relacionados ao uso do álcool, analise as seguintes assertivas:

- I. Hiperatividade autonômica, tremor, insônia, vômitos e ansiedade são sintomas relacionados à abstinência de álcool.
- II. Fala arrastada, incoordenação, instabilidade na marcha e nistagno estão relacionados a intoxicação alcoólica.
- III. Tolerância é caracterizada pelo efeito maior da substância com o uso continuado da mesma quantidade de álcool.
- IV. Homens apresentam taxas mais elevadas de consumo de álcool e de transtornos relacionados em comparação com as mulheres.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, II e IV.
- C) Apenas I, III e IV.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34 – Mulher de 30 anos procura atendimento com relato de há 6 meses sentir, na maioria dos dias, ansiedade e preocupação com seu desempenho no trabalho e no curso de pós-graduação. Considera suas preocupações exageradas e diz não conseguir controlá-las. Queixa-se também de cansaço, dificuldades de manter a concentração, dores musculares e irritação, além de referir episódios recorrentes de cefaleia e diarreia. Fez uso, algumas vezes, de clonazepam, com alívio parcial e temporário dos sintomas. Nega uso de álcool, drogas e outros medicamentos, além de negar a presença de outra condição médica conhecida. Qual o diagnóstico mais provável dessa paciente?

- A) Síndrome do Intestino Irritável.
- B) Transtorno de Pânico.
- C) Transtorno Depressivo Maior.
- D) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- E) Fobia Específica.

QUESTÃO 35 – De acordo com o DSM-5, NÃO é considerado critério para diagnóstico de um Transtorno Depressivo Maior:

- A) Tentativa de suicídio.
- B) Agressividade.
- C) Aumento de apetite.
- D) Fadiga.
- E) Indecisão.

QUESTÃO 36 – Entre 10 e 20% dos pacientes diagnosticados com depressão unipolar tem seu diagnóstico modificado ao longo do tempo para transtorno bipolar. Assinale a alternativa que apresenta uma característica do episódio depressivo que indica maior probabilidade de transtorno bipolar.

- A) Primeiro episódio no puerpério.
- B) Queixa de insônia inicial.
- C) Queixas somáticas.
- D) Relato de perda de peso.
- E) Ausência de história familiar.

QUESTÃO 37 – Mulher de 20 anos consulta acompanhada pela mãe. Desde os 15 anos de idade, a paciente tem apresentado comportamentos recorrentes de automutilação, cortando-se nos braços e nas pernas. Sempre que se sente sozinha, tem vontade de se machucar, e, muitas vezes, obtém alívio temporário do sofrimento psíquico com as autoagressões. No entanto, queixa-se de um sentimento de vazio crônico. Tem o mesmo namorado há cerca de 3 anos, com quem já terminou e reatou “umas cem vezes”. A mãe conta que, sempre que o namorado fala em terminar a relação, ela ameaça se matar. A paciente diz que o namorado é “às vezes perfeito, mas às vezes um idiota”. Sua mãe conta que ela tem episódios de raiva e de agressividade durante os quais é muito difícil controlá-la. A mãe fala ainda que, por vezes, a filha diz que todos estão contra ela e parece sentir-se perseguida. A paciente relata episódios de alimentação compulsiva, eventualmente seguidos de purgação por vômitos. Qual o diagnóstico provável dessa paciente?

- A) Transtorno de Personalidade Borderline.
- B) Transtorno Bipolar tipo 2.
- C) Transtorno de Personalidade Dependente.
- D) Transtorno Depressivo Maior.
- E) Transtorno de Personalidade Antissocial.



QUESTÃO 38 – Sobre o uso de psicofármacos na gestação e lactação, assinale a alternativa correta.

- A) A carbamazepina é o fármaco de escolha para o tratamento bipolar durante a gestação.
- B) O lítio, apesar de contraindicado durante a gestação, pode ser usado durante a lactação sem restrições, pois sua passagem para o leite materno é mínima.
- C) O haloperidol está associado a malformações cardíacas.
- D) Benzodiazepínicos podem ser usados livremente durante todo o período gestacional, pois não apresentam potencial teratogênico nem complicações neonatais.
- E) O ácido valproico deve ser evitado durante a gestação, pois está associado a diversas malformações fetais, como anomalias craniofaciais, defeitos urogenitais e meningomielociele.

QUESTÃO 39 – Uma das alternativas terapêuticas quando um paciente com Transtorno Depressivo Maior responde parcialmente ao tratamento é a adição de um fármaco de outra classe farmacológica que potencialize a ação antidepressiva. Qual dos fármacos abaixo é considerado um potencializador?

- A) Lítio.
- B) Clozapina.
- C) Metformina.
- D) Biperideno.
- E) Vareniclina.

QUESTÃO 40 – Visto que o suicídio é um problema de saúde pública, é importante identificar e tratar os pacientes que apresentam as maiores chances de cometê-lo. Analise as assertivas abaixo sobre o assunto:

- I. Ser homem, desemprego, etilismo e episódio depressivo são fatores de risco para suicídio.
- II. Tentativas de suicídio prévio é um dos maiores indicadores de risco.
- III. São fatores protetores contra o suicídio: suporte social, maternidade, gestação e religiosidade.
- IV. Não se deve perguntar ao paciente com depressão se ele tem pensamentos suicidas, pois isso pode incentivá-lo a tentar suicídio.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 41 – Um ataque de pânico é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso acompanhado de manifestações físicas e psíquicas com grande sofrimento para a pessoa. Em relação a essa condição, analise as seguintes assertivas:

- I. Pode ser acompanhado dos seguintes sintomas: palpitações, sudorese, sensação de falta de ar, dor torácica, medo de morrer ou enlouquecer.
- II. Entre as técnicas psicoterápicas para o manejo de um ataque de pânico na emergência, está a respiração diafragmática e a psicoeducação a respeito da condição.
- III. O uso de inibidores seletivos da recaptção de serotonina é a melhor opção na emergência para cessação do ataque no momento agudo da crise.

Quais são as corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 42 – Paciente feminina, 70 anos, com diagnóstico de Transtorno de Humor Bipolar, vem em uso de lítio 900 mg/dia há cerca de 20 anos e paroxetina 20 mg/dia há cerca de um ano em função de um episódio depressivo. Chega à emergência apresentando vômitos, tonturas, fala arrastada e tremores. Rapidamente evolui para convulsões generalizadas e anúria. Apresentava níveis séricos de lítio em 4,1 mEq/l. Qual o diagnóstico e manejo indicado nessa situação?

- A) Intoxicação por paroxetina, medidas de suporte cardíaco e respiratório e manejo das convulsões.
- B) Intoxicação por paroxetina, uso de carvão ativado e medidas de suporte cardíaco e ventilatório.
- C) Intoxicação por lítio, medidas de suporte cardíaco e ventilatório e uso de carvão ativado.
- D) Intoxicação por lítio, medidas de suporte cardíaco e ventilatório, manejo das convulsões e uso de carvão ativado.
- E) Intoxicação por lítio, medidas de suporte cardíaco e ventilatório, manejo das convulsões e hemodiálise.

QUESTÃO 43 – A Síndrome Neuroléptica Maligna é uma emergência médica potencialmente fatal. Em relação a essa reação, analise as assertivas abaixo:

- I. É caracterizada por rigidez muscular, hipertermia, instabilidade autonômica e alteração do estado mental.
- II. É associada com mais frequência a antipsicóticos de primeira geração de alta potência. No entanto, antipsicóticos de baixa potência e de segunda geração também podem ser envolvidos no seu aparecimento.
- III. São fatores de risco o aumento da dose da medicação, troca de medicação e uso parenteral.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 44 – O mecanismo de ação sugerido para o antidepressivo venlafaxina é a inibição

- A) seletiva da recaptação da dopamina.
- B) da colinesterase.
- C) da serotonina e da noradrenalina.
- D) da monoaminoxidase.
- E) seletiva da recaptação da serotonina.

QUESTÃO 45 – O fármaco efetivo para o tratamento por uso de álcool, promovendo importante redução da frequência de consumo alcoólico, é:

- A) Modafenil.
- B) Clordiazepóxido.
- C) Levomepromazina.
- D) Buspirona.
- E) Dissulfiram.

QUESTÃO 46 – A respeito do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento apresenta resultados positivos em curto prazo, mas não tem impacto no funcionamento do indivíduo em longo prazo.
- B) A presença de comorbidades psiquiátricas é muito comum, atingindo mais da metade dos pacientes com o diagnóstico.
- C) Psicoterapias não apresentam eficácia em relação às alterações comportamentais.
- D) Sua prevalência em crianças e adolescentes vem crescendo exponencialmente nas últimas décadas.
- E) Para seu diagnóstico, são exigidos, concomitantemente, sintomas de déficit de atenção e de hiperatividade.

QUESTÃO 47 – Considerando o uso de psicofármacos em idosos, assinale a alternativa correta.

- A) O antidepressivo tricíclico mais indicado é a nortriptilina.
- B) A duloxetina é o inibidor seletivo da recaptação da serotonina mais indicado.
- C) O uso do lítio deve ser feito com maior precaução em função da redução da função hepática.
- D) Benzodiazepínicos são os fármacos de escolha para o tratamento do delírium.
- E) Antipsicóticos atípicos não estão associados ao aumento da mortalidade cardiovascular.

QUESTÃO 48 – São fatores associados a um pior prognóstico em Esquizofrenia:

- I. Sintomas de Transtorno de Humor (especialmente depressivos).
- II. Início insidioso.
- III. Sintomas positivos.
- IV. Início precoce.
- V. Ausência de fatores precipitantes.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I, III e IV.
- C) Apenas II, III e IV.
- D) Apenas II, IV e V.
- E) Apenas III, IV e V.

QUESTÃO 49 – Em relação à Eletroconvulsoterapia (ECT), é INCORRETO afirmar que:

- A) Pacientes gestantes podem ser submetidas à ECT, visto que não existem evidências de efeitos sobre o feto.
- B) A perda transitória de memória é um dos efeitos colaterais mais frequentes.
- C) O uso de relaxantes musculares deve ser evitado durante o procedimento, visto que eles interferem na monitorização da crise convulsiva.
- D) A ECT pode ser utilizada normalmente em pacientes idosos.
- E) As taxas de mortalidade relacionadas ao uso do ECT são baixas, sendo ainda considerado um procedimento bastante seguro e útil.

QUESTÃO 50 – Em relação aos Transtornos de Personalidade, é correto afirmar que:

- A) Paranoide, esquizoide e esquizotípica compõem os Transtornos de Personalidade do grupo B.
- B) As pessoas com Transtorno de Personalidade Antissocial, geralmente, apresentam remorso por seus atos e ajustam-se facilmente às normas estabelecidas, levando em consideração as outras pessoas.
- C) O Transtorno de Personalidade Borderline é caracterizado por relacionamentos interpessoais instáveis, perturbação da identidade, impulsividade, sentimentos de vazio e comportamento suicida e automutilante.
- D) As pessoas com Transtorno de Personalidade Esquizoide são caracterizadas por apresentarem delírios de referência, crenças bizarras, afeto inadequado e humor deprimido.
- E) O Transtorno de Personalidade Histriônico só pode ser diagnosticado em pacientes do sexo feminino.