



EXAME AMRIGS 2016

RESIDÊNCIA COM PRÉ-REQUISITO: **PSIQUIATRIA**

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem o Exame AMRIGS, ACM e AMMS.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente devem permanecer em posse do candidato caneta de material transparente esferográfica de cor azul ou preta, lápis, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do candidato.
3. Verifique se o pré-requisito constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal da sala a Grade de Respostas devidamente preenchida, a Pesquisa de Satisfação e a Prova, caso deixe o local de prova antes das 4h de início da prova.
7. Os candidatos que deixarem o local de provas antes do tempo previsto poderão levar consigo a capa da prova, que contém, no verso, um espaço para anotação dos gabaritos. Será disponibilizado no site da AMRIGS, ACM e AMMS a prova padrão.
8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
9. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
10. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
11. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no Cronograma de Execução desse Exame.
12. Certifique-se de que este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

Boa prova!



Espaço para anotação dos gabaritos

| Questão | Gabarito |
|---------|----------|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |

| Questão | Gabarito |
|---------|----------|
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |

QUESTÃO 01 – Em relação ao Ácido Valproico, é correto afirmar que:

- A) Se ocorrer aumento nos níveis de transaminases, a medicação deve ter sua dose reduzida, ou deve ser retirada.
- B) É uma boa alternativa para mulheres grávidas com transtorno do humor bipolar.
- C) Está contraindicado em portadores de doenças do ciclo da ureia.
- D) Não está indicado para o tratamento de episódio depressivo em pacientes com transtorno do humor bipolar.
- E) A dose máxima utilizada não deve ultrapassar 30 mg/kg de peso/dia.

QUESTÃO 02 – Paciente previamente hígido, procura atendimento com queixa de episódios recorrentes e inesperados de medo intenso, que atinge o pico em minutos, acompanhados de sudorese, tremores, taquicardia e tontura. Relata preocupar-se em ter novos episódios e medo de “perder o controle”. Em relação à hipótese diagnóstica mais provável desse paciente, é correto afirmar que:

- A) Afeta aproximadamente 1% da população.
- B) Apresenta mesma prevalência entre homens e mulheres.
- C) Costuma apresentar boa resposta ao uso de anticonvulsivantes.
- D) Sintomas residuais são preditores de recaída.
- E) Com resposta completa, o tratamento pode ser interrompido após 6 meses.

QUESTÃO 03 – Analise as seguintes assertivas, verificando se são considerados medicamentos de primeira linha no tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada:

- I. Duloxetina.
- II. Pregabalina.
- III. Imipramina.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 04 – Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, é correto afirmar que:

- A) Está associado à presença de comorbidades psiquiátricas em até 70% dos casos.
- B) Apesar de ser mais prevalente em meninas, na idade adulta, a prevalência se iguala entre os sexos.
- C) Em geral, abordagens psicológicas são tão eficazes quanto psicofármacos.
- D) Em adultos, os antidepressivos apresentam o mesmo tamanho de efeito em relação ao tratamento com psicoestimulantes.
- E) Na presença de comorbidade com transtorno do humor bipolar, deve-se iniciar o tratamento combinado para os dois transtornos.

QUESTÃO 05 – Sobre a Eletroconvulsoterapia (ECT), analise as assertivas abaixo:

- I. É contraindicada no terceiro trimestre da gestação.
- II. Pode ser utilizada no tratamento da Síndrome Neuroléptica Maligna.
- III. O efeito adverso mais comum é o déficit cognitivo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Analise as seguintes assertivas, verificando se são fatores de risco para recorrência de episódio depressivo maior:

- I. Idade de início tardia (acima dos 60 anos).
- II. Presença de transtornos psiquiátricos comórbidos.
- III. História familiar de transtorno de humor.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 07 – Na fase de manutenção do tratamento para o Transtorno de Humor Bipolar, para uso em monoterapia, é considerada medicação de primeira linha:

- A) Carbamazepina.
- B) Asenapina.
- C) Topiramato.
- D) Quetiapina.
- E) Gabapentina.

QUESTÃO 08 – Mulher, 25 anos, vem para atendimento com relato de que nos últimos meses tem apresentado episódios recorrentes de ingestão de grandes quantidades de comida associada à sensação de falta de controle sobre a ingestão, que é seguida por vômitos autoinduzidos e uso de laxantes devido ao receio de engordar. No passado, costumava seguir dietas restritivas, com períodos prolongados de jejum e prática de atividade física intensa e frequente. Ao exame, apresenta índice de massa corporal de 15. A hipótese diagnóstica atual mais provável é a de:

- A) Anorexia Nervosa tipo compulsão alimentar purgativa.
- B) Anorexia Nervosa tipo restritivo.
- C) Bulimia Nervosa.
- D) Transtorno de Compulsão Alimentar.
- E) Transtorno Alimentar Restritivo/Evitativo.

QUESTÃO 09 – Dentro das parafilias, a excitação sexual recorrente e intensa, resultante de tocar ou esfregar-se em pessoa que não consentiu com esse ato, é característica central do:

- A) Transtorno Voyeurista.
- B) Transtorno Exibicionista.
- C) Transtorno Frotteurista.
- D) Transtorno do Sadismo Sexual.
- E) Transtorno Fetichista.

QUESTÃO 10 – Um homem de 43 anos procura atendimento uma semana após envolvimento em acidente automobilístico grave. Queixa-se de lembranças angustiantes sobre o acidente, pesadelos, humor entristecido, hipervigilância, nervosismo intenso quando é necessário entrar em veículos, dificuldade de concentração, momentos em que se sente em “câmera lenta”, e esforços para evitar lugares ou pensamentos que lembrem o acidente. Considerando o diagnóstico mais provável nesse caso, a melhor conduta no momento seria:

- A) Iniciar um antidepressivo.
- B) Prescrever um benzodiazepínico para uso conforme necessário.
- C) Iniciar psicoterapia.
- D) Associar psicoterapia ao uso de antidepressivos.
- E) Associar psicoterapia ao uso de benzodiazepínicos.

QUESTÃO 11 – Analise as assertivas abaixo:

- I. Abuso de substâncias.
- II. Presença de comorbidades clínicas.
- III. Homem branco.

Quais estão associadas a maior risco para a ocorrência de suicídio?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Uma paciente é internada para tratamento de abscessos em membros superiores e inferiores. Em seu prontuário, há o registro de internações anteriores devido ao mesmo quadro clínico, e é possível identificar cicatrizes antigas. Avaliações laboratoriais indicam a presença de material fecal nas lesões. Com base nessas informações, o diagnóstico mais provável é:

- A) Transtorno de Sintomas Somáticos.
- B) Transtorno Conversivo.
- C) Simulação.
- D) Transtorno Factício.
- E) Transtorno de Ansiedade de Doença.

QUESTÃO 13 – São características do Transtorno de Personalidade Esquizoide:

- I. Ideias de referência (excluindo delírios de referência).
- II. Crenças estranhas ou pensamento mágico.
- III. Indiferença em relação ao elogio ou à crítica de outros.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Paciente em tratamento para Transtorno Obsessivo Compulsivo há 2 meses, em uso de Sertralina 150 mg/dia, apresenta aproximadamente 60% de melhora dos sintomas e nega sintomas adversos relevantes. Qual a próxima conduta mais correta a ser adotada?

- A) Aumento da dose do antidepressivo em uso.
- B) Troca para outro antidepressivo da mesma classe.
- C) Troca para antidepressivo de classe diferente.
- D) Potencialização com Bupropiona.
- E) Associação de antipsicótico atípico em baixa dose.

QUESTÃO 15 – Em relação ao tratamento do tabagismo, qual a alternativa INCORRETA?

- A) As maiores preocupações com o uso de Vareniclina estão relacionadas com possíveis efeitos adversos neuropsiquiátricos.
- B) O paciente deve parar de fumar no mesmo dia em que iniciar a terapia de reposição de nicotina.
- C) Com o tratamento correto, as taxas de abstinência podem chegar a 30% após 1 ano da cessação do tabagismo.
- D) A data para parar de fumar deve ocorrer 1 semana após o início da medicação com Bupropiona.
- E) A combinação de Vareniclina com Bupropiona parece ser mais efetiva na obtenção da abstinência.

QUESTÃO 16 – Dentre os benzodiazepínicos abaixo, qual apresenta o menor tempo de meia-vida?

- A) Alprazolam.
- B) Midazolam.
- C) Estazolam.
- D) Bromazepam.
- E) Flunitrazepam.

QUESTÃO 17 – Durante o tratamento da Esquizofrenia, o surgimento de efeitos adversos pode ocorrer devido ao uso de antipsicóticos. As alternativas abaixo relacionam corretamente os efeitos adversos com seu possível manejo, EXCETO em:

- A) Distonia aguda: uso de Biperideno.
- B) Parkinsonismo: uso de Triexifenidil.
- C) Acatisia: uso de Propranolol.
- D) Discinesia tardia: uso de Dantrolene.
- E) Convulsões pelo uso de Clozapina: uso de Ácido Valproico.

QUESTÃO 18 – Embora os Transtornos Neurocognitivos Maiores possuam características em comum, alguns sinais e sintomas podem auxiliar na diferenciação entre as demências corticais e as subcorticais. Em relação ao comprometimento proeminente da memória, déficit de linguagem e visuoespacial, apraxia, agnosia, sem sinais motores ou labilidade afetiva proeminentes, analise os transtornos abaixo:

- I. Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal.
- II. Transtorno Neurocognitivo Maior devido à Infecção pelo HIV.
- III. Transtorno Neurocognitivo devido à Doença de Huntington.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 19 – Homem alcoolista, 45 anos, é hospitalizado para realização de cirurgia. No pós-operatório, desenvolve quadro caracterizado por flutuação no nível de consciência, desorientação, agitação psicomotora, tremores, febre baixa e alucinações táteis. Em relação ao quadro apresentado pelo paciente, é correto afirmar que:

- A) Benzodiazepínicos estão contraindicados.
- B) A intensidade máxima dos sintomas é esperada que ocorra no quarto ou quinto dia de abstinência.
- C) Antipsicóticos de alta potência não devem ser utilizados, pelo risco de desenvolvimento de convulsões.
- D) O óbito nessas situações, na maioria das vezes, ocorre por traumatismo cranioencefálico.
- E) O tratamento dessa situação é feito com reposição de Tiamina.

QUESTÃO 20 – É considerado sintoma positivo da Esquizofrenia:

- A) Expressão emocional diminuída.
- B) Alogia.
- C) Alucinação auditiva.
- D) Avolia.
- E) Anedonia.

QUESTÃO 21 – Dentre os antipsicóticos abaixo, assinale aquele que provavelmente cause menores efeitos extrapiramidais.

- A) Risperidona.
- B) Olanzapina.
- C) Quetiapina.
- D) Clorpromazina.
- E) Haloperidol.

QUESTÃO 22 – A Depressão Atípica caracteriza-se por:

- A) Diminuição do apetite e hipersonia.
- B) Diminuição do apetite e insônia.
- C) Aumento do apetite e insônia.
- D) Aumento do apetite e hipersonia.
- E) Não ocorrer alterações nem do apetite, nem do sono.

QUESTÃO 23 – Na Esquizofrenia, é correto afirmar que:

- A) Os episódios psicóticos costumam iniciar na infância.
- B) O início dos sintomas pode ser abrupto ou insidioso e metade dos pacientes apresenta queixas de depressão.
- C) O início dos sintomas na infância é visto, tradicionalmente, como bom prognóstico para a doença.
- D) O prejuízo cognitivo é raro, tanto no surto psicótico como na evolução do quadro clínico.
- E) Metade da população diagnosticada com a doença apresenta recuperação completa dos sintomas.

QUESTÃO 24 – Em pessoas portadoras de Transtorno do Humor Bipolar, sobre o risco de suicídio ao longo da vida, é correto afirmar que:

- A) É igual ao da população em geral.
- B) É duas vezes maior do que na população em geral.
- C) É 15 vezes maior do que na população em geral.
- D) A história pregressa de tentativa de suicídio não está associada ao risco de suicídio atual.
- E) Ele responde por 50% de todos os suicídios ocorridos em uma população em geral.

QUESTÃO 25 – Em relação às Fobias Específicas, assinale a alternativa correta.

- A) O tratamento de escolha é a terapia de exposição.
- B) Os inibidores seletivos da recaptção de serotonina são muito eficazes em seu tratamento.
- C) Seu início, normalmente, ocorre após os 30 anos.
- D) Sua prevalência na população em geral é de 20%.
- E) Acometem mais frequentemente homens do que mulheres.

QUESTÃO 26 – De acordo com o DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais), analise as seguintes características do transtorno mental:

- I. É uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na regulação emocional ou no comportamento do indivíduo, refletindo disfunções no funcionamento mental.
- II. Uma resposta esperada e aprovada culturalmente a um estressor ou morte de um ente querido é classificada como transtorno mental.
- III. O diagnóstico deve ter utilidade clínica e é equivalente à necessidade de tratamento.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 27 – Em relação aos Transtornos de Personalidade, é correto afirmar que:

- A) No Transtorno de Personalidade Obsessivo-Compulsiva, diferentemente do Transtorno Obsessivo-Compulsivo, não é frequente a preocupação com a ordem e o perfeccionismo.
- B) O Transtorno de Personalidade se caracteriza por um padrão persistente de existência interna e comportamento, sendo difuso, inflexível, estável ao longo do tempo e se desvia das expectativas da cultura do indivíduo.
- C) O Transtorno de Personalidade Esquizoide envolve distorções cognitivas ou perceptivas e excentricidades no comportamento.
- D) No Transtorno de Personalidade Antissocial, a pessoa evita relacionamentos pessoais, apresentando um padrão fóbico e com grande interesse e respeito pelos outros.
- E) O Transtorno de Personalidade Dependente apresenta um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia.

QUESTÃO 28 – Em relação à Esquizofrenia, analise as assertivas abaixo:

- I. Apesar da forte contribuição dos fatores genéticos na determinação do risco para a doença, a maioria dos indivíduos com esse diagnóstico não tem história familiar de psicose.
- II. A estação do ano no nascimento é associada à incidência desse transtorno.
- III. Em torno de 5% dos indivíduos com essa doença morrem por suicídio.
- IV. Não existem características que distinguem a expressão clínica do transtorno em relação ao sexo feminino ou masculino.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 – Em relação às teorias psicanalíticas, é correto afirmar que:

- A) Wilfred Bion teorizou sobre a ausência de uma parte psicótica da personalidade em pessoas saudáveis.
- B) Sigmund Freud era contrário ao conceito de pulsão, nunca fazendo uso dele em sua obra.
- C) Karl Abraham postulava que a neurose obsessiva resulta de uma fixação no estágio oral do desenvolvimento psicosssexual.
- D) Donald Winnicott dava pouco valor ao objeto transicional, afirmando que a mãe era insubstituível para o desenvolvimento do bebê.
- E) Melanie Klein postulava que a projeção e a introjeção estavam entre as principais operações defensivas nos primeiros meses de vida do bebê.

QUESTÃO 30 – Estamos vivendo atualmente um elevado índice de situações traumáticas em função da violência urbana. Nesse sentido, é primordial o atendimento de pacientes traumatizados em setores de emergência. Em relação aos transtornos relacionados a eventos traumáticos, analise as seguintes assertivas:

- I. É importante, para um melhor prognóstico, induzir o paciente, já no primeiro atendimento, a descrever o evento traumático, fazendo com que ele retorne à cena violenta.
- II. Mesmo que o paciente apresente sintomas de ansiedade, deve-se evitar o uso de benzodiazepínicos.
- III. Isoladamente, a presença de sintomas dissociativos é o melhor preditor de risco para desenvolvimento de Transtorno do Estresse Pós-traumático.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 31 – Analise as seguintes assertivas em relação ao uso de psicofármacos na amamentação:

- I. Sertralina, Paroxetina e Fluvoxamina são as primeiras escolhas entre os inibidores seletivos da receptação de serotonina.
- II. O Diazepam pode ser usado durante a amamentação, desde que por curtos períodos de tempo e com doses inferiores a 30 mg/dia.
- III. O Valproato e a Carbamazepina são os estabilizadores de primeira escolha durante a lactação por sua baixa concentração no leite materno.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 32 – Os transtornos relacionados ao uso de substâncias são um problema de saúde pública que trazem prejuízos não somente aos usuários, mas às famílias e demais pessoas que convivem com esses pacientes. Em relação a esses transtornos, analise as assertivas abaixo:

- I. Uma das dificuldades de se fazer o diagnóstico de transtorno por uso de Cannabis é o fato dessa substância não causar abstinência.
- II. Adolescentes que usam MDMA/ecstasy e outros alucinógenos apresentam prevalência maior de outros transtornos por uso de substâncias em comparação a usuários de substâncias não alucinógenas.
- III. Os exames de urina para drogas opióides como heroína, morfina e codeína permanecem positivos durante 12 a 36 horas após a administração.
- IV. Transtornos como depressão, bipolaridade e ansiedade não aumentam o risco para o desenvolvimento de transtorno por uso de tabaco.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – Homem, 50 anos, referindo ter a convicção há alguns anos de que está sendo perseguido por um grupo de colegas de trabalho, embora não haja nenhuma evidência disso. Mostra-se convicto de que esse grupo está lhe causando prejuízos, apesar de exemplos de colaboração por parte desses colegas. O paciente inclusive tem pensado em acionar judicialmente um colega em particular que, segundo ele, tem lhe perseguido e espionado. Apesar desse fato, apresenta bom desempenho profissional e social. Nega a presença de alucinações, apresenta um discurso coerente e tem um comportamento organizado. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Esquizofrenia.
- B) Transtorno Esquizofreniforme.
- C) Transtorno Psicótico breve.
- D) Transtorno Delirante.
- E) Transtorno Esquizoafetivo.

QUESTÃO 34 – Em relação à intoxicação e à superdosagem com uso de psicofármacos, analise as assertivas abaixo:

- I. Os barbitúricos têm um potencial mais alto para letalidade do que os inibidores seletivos da recaptação de serotonina.
- II. Imipramina em doses acima de 2,5g são comumente fatais.
- III. Dosagens séricas de Lítio acima de 4,0 mEq/L podem ser fatais.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 35 – Em relação aos efeitos colaterais das medicações psicotrópicas, é correto afirmar que:

- A) Cerca de 80% das pessoas em início de tratamento com antidepressivos serotoninérgicos apresentam um aumento transitório da atividade psicomotora.
- B) As medicações antidopaminérgicas podem causar hiperprolactinemia, disfunção sexual e distonia.
- C) Disfunção sexual é um evento raro com uso de inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não devendo ser essa uma preocupação na escolha dessa classe de medicamentos.
- D) Ganho de peso e sedação não estão entre os efeitos colaterais causados por medicamentos anti-histaminérgicos.
- E) Amitriptilina, Trazodona e Mirtazapina têm baixo potencial para causar sedação.

QUESTÃO 36 – Sobre o mecanismo de ação da eletroconvulsoterapia, analise as seguintes assertivas:

- I. Séries de sessões levam à downregulation dos receptores adrenérgicos pós-sinápticos, mesma modificação observada em outros tratamentos com antidepressivos.
- II. Para uma melhor resposta, a convulsão causada não deve passar de 20 segundos de duração.
- III. Apesar da melhora dos sintomas depressivos, a eletroconvulsoterapia não afeta os neurônios serotoninérgicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – Em relação ao manejo na emergência de pessoas vítimas de abuso sexual, é correto afirmar que:

- A) A anticoncepção de emergência não deve ser realizada sem autorização judicial.
- B) As profilaxias para DST, tétano e hepatite devem ser feitas 2 semanas após o evento.
- C) Em caso de suspeita ou confirmação de violência sexual contra a mulher, em todas as faixas etárias, deve ser feita a notificação compulsória.
- D) Não se deve fazer a coleta de materiais ou exame físico na emergência para evitar a retraumatização das vítimas.
- E) Para violência sexual com penetração, não é necessário realizar profilaxia para hepatite B.

QUESTÃO 38 – A contaminação pelo HIV e a AIDS pode trazer uma série de consequências neuropsiquiátricas. Sobre elas, assinale a alternativa correta.

- A) Quadros de demência não podem ser associados ao HIV.
- B) O transtorno neurocognitivo costuma ser mais prevalente em indivíduos com episódios de imunossupressão grave, altas cargas virais no líquido cerebroespinal, anemia e hipoalbuminemia.
- C) Como os inibidores da protease não envolvem a isoenzima 3A do citocromo P450, a maior parte dos psicofármacos não tem interação com esses agentes antirretrovirais.
- D) Pacientes em uso de medicação antirretroviral não devem usar o lítio como estabilizador do humor.
- E) Com a chegada da terapia antirretroviral, houve uma redução significativa dos quadros de transtornos neurocognitivos associados ao HIV.

QUESTÃO 39 – Homem, 45 anos, apresenta, desde o início da idade adulta, preocupações recorrentes sobre estar sujo e medo de se contaminar com alguma doença. Quando entra em contato com outras pessoas, precisa lavar as mãos repetidas vezes, seguindo um ritual que chega a tomar algumas horas em determinadas situações. Tem crises de ansiedade se não consegue fazer os rituais de limpeza e tem cada vez mais se isolado do convívio social em função dessas preocupações. Em relação ao provável diagnóstico, analise as assertivas abaixo:

- I. Esse transtorno ganhou um capítulo exclusivo no DSM-V em função de sua gama de validadores diagnósticos.
- II. Abuso físico e sexual na infância e outros eventos traumáticos foram associados a um risco elevado para desenvolvimento desse transtorno.
- III. Disfunções no córtex orbitofrontal e no córtex cingulado anterior estão presentes nesse transtorno.
- IV. A prevalência durante a vida na população geral é estimada em cerca de 10%.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II e IV.
- B) Apenas III e IV.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 40 – Mulher, 50 anos, vem trazida inconsciente à emergência por familiares, apresentando febre de 41°C, rigidez muscular, sudorese, taquicardia, taquipneia e hipertensão. Os familiares informam que ela, há muitos anos, está em tratamento psiquiátrico, mas não sabem informar o diagnóstico nem a medicação em uso. No entanto, referem que usa somente uma medicação e que recentemente foi dobrada a dose. Nos exames laboratoriais, apresenta aumento de transaminases e de CPK. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Intoxicação por Lítio.
- B) Síndrome Serotoninérgica.
- C) Intoxicação por Ácido Valproico.
- D) Síndrome Neuroléptica Maligna.
- E) Síndrome Extrapiramidal.

QUESTÃO 41 – O Transtorno da Personalidade Borderline é caracterizado por:

- A) Aceleração da fala e do pensamento.
- B) Impulsividade e instabilidade nas relações interpessoais.
- C) Perfeccionismo e detalhismo.
- D) Arrogância e grandiosidade.
- E) Introversão e excentricidade.

QUESTÃO 42 – Alterações da sensopercepção são comumente encontradas no Exame do Estado Mental de pacientes com:

- A) Esquizofrenia.
- B) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- C) Transtorno da Personalidade Esquizotípica.
- D) Transtorno de Humor.
- E) Transtorno de Conduta.

QUESTÃO 43 – Homem, 25 anos, procura atendimento relatando há 10 dias ter sofrido acidente de trânsito em que seu carro capotou, mas do qual resultou sem ferimentos. Refere, desde então, quadro de lembranças intrusivas do acidente, pesadelos recorrentes em que capota seu carro, revivências tipo flashback do acidente, incapacidade de sentir felicidade, ansiedade muito intensa ao andar de carro, irritabilidade, perturbação do sono, problemas de concentração e uma sensação estranha de mover-se em “câmera lenta”. Considerando o evento desencadeante e o tempo decorrido desde então, qual o diagnóstico provável?

- A) Transtorno Esquizofreniforme.
- B) Transtorno de Estresse Pós-traumático.
- C) Transtorno de Estresse Agudo.
- D) Síndrome de Tourette.
- E) Transtorno Depressivo Maior.

QUESTÃO 44 – Sobre a disfunção sexual associada ao uso de inibidores seletivos da recaptção da serotonina, assinale a alternativa correta.

- A) Em homens, é caracterizada por diminuição da libido e ejaculação precoce.
- B) Mulheres não costumam apresentar tal efeito adverso.
- C) A disfunção sexual tende a desaparecer com a continuidade do tratamento.
- D) Uma das alternativas terapêuticas é o uso associado de Bupropiona.
- E) A diminuição da dose não é recomendada, pois a disfunção não é dose-dependente.

QUESTÃO 45 – Mulher, 40 anos, com diagnóstico de transtorno de pânico, busca atendimento relatando insatisfação pela ausência de melhora com o tratamento realizado. Está há 5 meses em uso de Fluoxetina, iniciou com 20 mg ao dia, depois aumentou para 40 mg e, há 2 meses, usa 60 mg, sem resposta. Persiste com ataques de pânico e sintomas agorafóbicos. Qual a alternativa terapêutica mais adequada para essa paciente?

- A) Manter a Fluoxetina e associar Paroxetina.
- B) Manter a Fluoxetina e associar Quetiapina.
- C) Suspender a Fluoxetina e encaminhar a paciente para psicoterapia psicodinâmica.
- D) Suspender a Fluoxetina e iniciar Clonazepam.
- E) Suspender a Fluoxetina e iniciar Venlafaxina.

QUESTÃO 46 – Alguns pacientes com transtorno depressivo maior necessitam de tratamento antidepressivo de manutenção (por dois anos ou mais) como forma de evitar a recorrência da depressão. Entre os fatores listados a seguir, assinale aquele que NÃO justifica o tratamento de manutenção.

- A) História familiar de depressão.
- B) Presença de múltiplas comorbidades clínicas.
- C) Histórico pessoal de três ou mais episódios depressivos.
- D) História de recorrência quando da descontinuação de antidepressivos.
- E) Sintomas residuais.

QUESTÃO 47 – Sobre antidepressivos, assinale a alternativa correta.

- A) A Trazodona tem seu uso limitado em função da agitação que causa.
- B) A Mirtazapina apresenta efeitos adversos intensos de sedação e ganho de peso.
- C) A Fluoxetina apresenta síndrome de retirada mais marcada em função de sua meia-vida curta.
- D) A Bupropiona é o antidepressivo de escolha em pacientes com epilepsia.
- E) A Trancilipromina é muito eficaz quando usada em associação com a Fluoxetina.

QUESTÃO 48 – Assinale a alternativa correta sobre a eletroconvulsoterapia.

- A) É um procedimento extremamente arriscado reservado apenas para pacientes com Esquizofrenia Refratária.
- B) A anestesia utilizada é local na região do estímulo elétrico.
- C) Benzodiazepínicos devem ser suspensos antes do procedimento.
- D) Gravidez e presença de marca-passo cardíaco representam contra-indicações absolutas.
- E) Em média, são necessárias entre 2 e 4 sessões para resolução do quadro psiquiátrico.

QUESTÃO 49 – Antipsicóticos atípicos têm sido muito usados nos últimos anos no tratamento de diversos transtornos psiquiátricos em função de sua eficácia e de seu perfil de efeitos adversos. Assinale a alternativa que inclui apenas medicações dessa classe.

- A) Flufenazina, Tioridazina e Trifluoperazina.
- B) Clozapina, Risperidona e Haloperidol.
- C) Levomepromazina, Clorpromazina e Fenotiazina.
- D) Quetiapina, Olanzapina e Aripiprazol.
- E) Nefazodona, Mianserina e Fluvoxamina.

QUESTÃO 50 – A anomalia de Ebstein, uma malformação cardíaca em que há implantação baixa da valva tricúspide, está bastante associada ao uso de um psicofármaco no primeiro trimestre da gestação. Que psicofármaco é esse?

- A) Topiramato.
- B) Clozapina.
- C) Ácido Valproico.
- D) Diazepam.
- E) Lítio.